


[H] Chinese

15

Vol. xv

v. 36 - v. 48



唐王素先生外臺秘要方卷三十六目錄

小兒諸疾
下五十一門

小兒中風方四首

小兒敘逆上氣方七首

小兒天行方八首

小兒諸瘧方九首

小兒諸淋方六首

小兒遺尿失禁方五首

小兒大便不通方四首

小兒蠱毒血痢方九首

小兒疳痢方七首

小兒諸雜痢方四首

小兒齒不生方二首

小兒顛開不合方四首

小兒月蝕耳瘡方三首

小兒癰腫方二首

小兒疔瘡方七首

小兒頭面熱瘡方七首

小兒侵淫瘡方三首

小兒惡瘡方五首

小兒風癰瘙癢方五首

小兒敘嗽方八首

小兒傷寒方三首

小兒諸黃方四首

小兒眼赤痛方八首

小兒小便不通方五首

小兒大便有血方三首

小兒赤白痢方七首

小兒熱渴痢方四首

小兒無辜瘡痢方三首

小兒忽衄血方六首

小兒頭熱盜汗方三首

小兒解頰方二首

小兒臍中汁出并瘡腫方一十一首

小兒丹毒方七首

小兒頭瘡方三首

小兒瘰癧方二首

小兒蠅螬瘡方二首

小兒火灼瘡方二首

小兒疝氣陰癰方八首

小兒陰瘡及腫方八首

小兒蠹蟲蝕下部方四首

小兒蛇蟲方七首

小兒瘰癧瘡方四首

小兒癰瘡方六首

小兒雜瘡方六首

小兒脫肛方六首

小兒疳濕瘡方六首

小兒蛇蟲及寸白方五首

小兒疥瘡方六首

小兒誤吞物方四首

唐王燾先生外臺秘要方卷三十六

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

小兒中風方四首

千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方 石膏雞子真珠一兩 右藥以水二升煮取五六沸內真

珠煮取一升去滓稍稍分服之

又療少小中風脈浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方 甘草炙芍藥 桂心 生薑各一大棗四 右五

味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌如常法此張仲景桂枝湯但剖分小兩

又療少小新生中風二物鹽毛散方 鹽毛鬚頭毛一把 生麝香二大豆許 右藥以乳汁和於銅器中微火上

煎令焦熟出研末之小兒不能飲以乳汁和之於葦竹筒中盛瀉入咽中然後飲乳汁入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣五物甘草等生摩膏方 甘草

防風各一白朮 桔梗各二兩 雷丸二兩 右藥切以不中水猪脂一斤煎取成膏合諸藥於微火上煎

之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以

少膏摩顙上及手足心甚辟風寒良翼同並出第五卷中

小兒咳嗽方八首

小品療少小咳嗽腹脹七物小五味子湯方 五味子 碎紫苑各一 甘草 炙麻黃 歸生薑 黃芩 桂心

各一 右藥咬咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小咳嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物款冬丸方 款冬花 紫苑各一 伏龍肝 分桂心 各

右藥搗篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日三千金

又療少小十日以上至五十日卒得暴效吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方 桔梗 紫苑各一 甘草 各

尚德按千金鹽毛一把取背前一交脊上會中按取如手母指大

灸麥門冬七分 右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差為度千金有桂心無桔梗以水二升

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫苑湯方 紫苑 杏仁去

夫甘草 炙黃芩 麻黃節去 橘皮 桂心 青木香 當歸略一大黃 右十味切以水三升煮取九

合去滓一歲以上至五歲兒以意量之分服千金云兒六至十餘日一服三合餘同

千金療少小欬嗽八物生薑煎方 生薑兩 乾薑兩 桂心兩 甘草三 杏仁一升 款冬花 紫苑兩 三蜜

升 右藥末之以蜜合諸藥微火煎之使如飴餹量其大小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許

日四五甚良出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏仁湯方 麻黃去 杏仁四升 右二味切以水一升煮取七合去滓分服

百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之忌如常法

又療少小欬嗽方 紫苑分 貝母分 款冬花分 右三味搗為散取豆許著乳頭令兒飲之日三飲母忌

如常法

劉氏療小兒欬嗽不得臥方 甘草六分 桔梗四分 桑白皮 貝母 伏苓各三分 大青 五味子

人參各二 右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與服忌如常法

小兒欬逆上氣方七首

千金杏仁丸主大人小兒欬逆上氣方 杏仁半 右一味熟搗如膏蜜一升分為三分以一分內杏仁

搗合強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

又射干湯主小兒欬逆喘急如水雞聲方 射干兩 麻黃節去 紫苑 甘草炙 生薑兩 桂心五半 夏五枚

大棗一十枚 右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分溫服二合忌餽羊肉生葱

又方 半夏四兩 生薑三 桂心 紫苑 細辛 阿膠兩 甘草二兩 款冬花二 蜜一 右九味切以水

尚德按合 千金作令 尚德按千 金五合下 有煎一沸 三字去滓

二字在內
蜜上二合
下有日三
二字
尚德按干
金名五味
子湯麻黃
以下一分
作並六兩
疑是六錢
之說細幸
款冬花各
二錢有白
木分兩開
共十二味
又按本文
不下即食
不下之謂

一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大小多少
加減之

又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不怠食則吐不下方 五味子分二麻黃去節當歸

仁人參分細辛分乾薑分桂心分紫宛分款冬花分甘草分一大黃分右十一味切以水二升半煮

取九合去滓兒六十日至百日日服二合半百日餘至二百日一服三合出方無款冬大黃有大棗三枚

食也不下大便故用大黃以下氣降而吐自止故用大黃千金翼療小兒寒熱逆膈中有澀乳吐不欲食尚德按食字乾地黃兩麥門冬半升五味子合大黃

硝石兩蜜升右六味切以水三升煮取一升去滓內硝石蜜煮令沸服二合日三胸中常有宿乳

一升許出兒大服五合

又療小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方 燒淡竹漚煮二十沸一服一合日五服大

大人服一升不妨食息乳哺並出第十卷中鼈甲一兩炙令極燈心握右二味以水二升煎取八合以意量

之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能胃涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣

其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小

冷耳

又療小兒傷寒方 生葛汁 淡竹漚各六右二味相和二三歲兒分三服不宜煮生服佳

又療少小未滿百日傷寒鼻身熱嘔逆麥門冬湯方 麥門冬分三桂心分八寒水石分八石膏分八甘草各分

右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

尚德按千金以水三升煮

通按雷丸止汗之藥粉亦撲汗之藥不汗之字疑誤在作出汗乃是

尚德按千金治小兒傷寒發黃又按千金無澄清以下十字尚德按千

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方 芍藥 黃芩 升麻 葛根各二 右藥切以水二升煮取九合去滓分四服並出第五卷中 歲以上分三服

小兒天行方八首

廣濟療小兒天行壯熱欬心腹脹妨方 人參 甘草炙 生地黃 麥門冬洗 茅根各六 右五味切以水二升煮取七合去滓以意量之分溫與服忌如常法

又方 麥門冬洗 茅根各六 甘草炙 人參各二 紫苑 升麻 貝母 竹瀝各二 右八味切以水二升煮取八合分服忌如常法

千金療少小有熱不汗二味通汗散方 雷丸兩 粉半 右藥搗篩以粉兜身以差為度

又療小兒生一月至五月乍寒乍熱方 細剉柳枝煮取汁以洗兒立效若渴絞冬瓜汁服之

又療小兒寒熱及赤氣中人豬蹄散方 取豬後腳懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立效並出第五卷中

劉氏療小兒天行頭痛壯熱方 青木香六分 白檀香三分 右二味搗散以清水和服之以水調塗頂頭痛立差

又方 吳藍 大青各十 甘草炙 生麥門冬洗 生薑各六 茵陳三分 梔子仁十枚 蘆根一握 右八味切以水二升煮取九合分溫服之忌如常法

又療小兒天行五日以後熱不歇方 桑葉一握 麻黃一兩 葱白切一鼓合 煎取九合去滓分服之

千金療小兒黃方 搗土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大豆許日服三合

又方 搗麥青汁服之

又方 搗韭根汁以滴兒鼻中少許即出黃水差

金云搗韭
根汁滓清

取如大豆
許滴犯鼻

中即出黃
水凝蓋外

臺誤以此
方節度挽

入上土瓜
根方中耳

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

尚德按千
金淡竹葉

一升小麥
二合

又療諸黃方 小豆二十枚 灰十枚 糯米四十粒 右三味搗散吹鼻中差並出第五卷中

小兒諸瘡方九首

廣濟療小兒瘡方 取蛇皮燒灰一錢七和冷水服之

又方 取驢軸下垢膩刮取和麴作燒餅與喫立差止

刪繁療小兒瘡或有能飲或不能飲母含藥與飲之常山酒煎方 常山二兩 桂心兩 甘草兩 右三味切

以酒一升煎取七合去滓分服吐差止

千金常山湯主小兒溫瘧方 常山四分 淡竹葉切 小麥三合 右三味以水一升半煮取五合一日至

七日犯一合為三服八日至十五日犯一合半為三服十六日至二十日犯二合為三服四十日至六

十日犯六合為三服六十日至百日犯一服二合半百日至二百日犯一服三合其一歲至七八歲犯

增藥水並以此為率

又方 灸兩乳下一指各三壯

又方 燒雞臍脰黃皮末和乳與服男雄女雌

又方 生鹿角末發時與一錢匕服之

又方 燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕出第五卷中

劉氏療小兒瘡 黃丹半錢匕以蜜水和與服苦冷以酒和與服之良

小兒眼赤痛方八首

古今錄驗療小兒眼痛方 取淡竹瀝試之

又方 取鯉魚膽點之

又方 取車前草汁和竹瀝點之

又方 以人乳浸黃連點之

小兒諸瘡方九首 小兒眼赤痛方八首

劉氏療小兒赤眼方 黃連二分朴硝一分 右二味以婦人爛汁浸之點眼良

小品療小兒羣肉赤眼方 生地黃薄切冷水浸以貼之妙

又方 取羊子肝薄切以井花水浸以貼之妙

又方 取黃柏以乳浸點之

小兒諸淋方六首

千金療小兒淋方 車前子一升水二升煮取一升分服之一方用車前草

又方 以冬葵子煮汁服之

又方 取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日再服

文仲療小兒淋兼石淋方 取特牛陰毛燒灰以漿水服一刀圭日再服

又方 榆皮 瞿麥各六 右二味切以水一升煮取半升去滓分溫服之

又方 小麥合葱白 右二味以水一升煮去滓取一半分服之

小兒小便不通方五首

廣濟療小兒熱極病小便赤澀或不通尿輒大啼呼滑石湯方 滑石計六分 苓十四分 冬葵子八分 車前草一分

升切 右四味以水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服甚良

小品療小兒小便不通地膚子湯方 地膚子一分 瞿麥 冬葵子各三分 知母 黃芩 猪苓 海藻 橘皮

皮 升麻 通草各半 大黃一分 右十一味切以水二升煮取一升大小多少量與服忌如常法千金

續金

千金療小兒小便不通方 車前草一分 小麥一分 右二味以水二升煮取一升二合去滓以煮粥服日

三四量與服

又方 冬葵子一分 右一味以水二升煮取一升入滑石末一分溫分服

尚德按今
千金枳實
橘皮俱有
為十二味

劉氏療小兒忽不得小便急悶方 葱白一握通草兩冬葵子合 右三味切以水二升煮取一升去滓量服

小兒遺尿失禁方五首

千金療小兒遺尿方 瞿麥 龍膽 石韋去毛桂心 皂莢各二分 雞腸草四分車前子五分人參兩 右

八味糖餅蜜丸如小豆每服五丸加至六七丸

又方 炙臍下一寸半隨年壯

又方 炙大敦三壯

又方 小豆葉搗汁服佳

又療失禁不覺出尿方 以豆醬和葱突黑如大豆許內尿孔中佳

小兒大便有血方三首

救急療小兒大便訖血出方 龜甲一枚炙 右一味以水和量多少大小服日三忌如常法千金云龜頭一枚

又方 以車缸一枚燒令赤內水中與服差同千金

又方 燒鰾帶灰塗乳上與飲之差同千金

小兒大便不通方四首

千金紫雙丸主小兒身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾唯

飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱唯此丸治之不差復可再服小兒欲下是其候哺食減少

氣急不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方 巴豆去心麩核仁各

油別搗甘遂甘草牡蠣麥門冬細篩畢搗巴豆麩仁令極熟乃內諸藥散更搗三千杵如藥燥入少蜜

足之半歲兒可服如荏子一雙一二歲兒服如半麻子作一雙三歲尚德按千金三四歲者服如麻子二九 兒服如麻子

尚德按千金名豐案
又按千金
真珠作朱
味職作職
通按荏子
大豆也如
大豆許二

尚德按千金
聚字下有
汁字黑
作墨

尚德按千金
人參一
兩每食後
服

粒
尚德按注
子即白蘇
子或豆豉
非大豆也
然一二歲
兒服如半
麻子半成
兒不當服
如錢豆

枝作一雙四歲兒服如麻子二九五六歲服如大麻子二九七八歲兒服如小豆二九九歲十歲兒微
大於小豆者二九常以雞鳴時服至日出不下者飲熱粥汁數合即下九皆雙出也下甚者飲冷
粥止之

必效療小兒大便不通方 炙口兩吻各一壯

又方 猪苓^兩 右一味以水少許煮雞矢白一錢七與服立差

又主小兒大小便不通妨悶方 白蜜^合 右一味煎為丸內下部中即通小便不通嚙生葱以綿裹少

許內小便道中即通

小兒赤白痢方七首

廣濟療小兒赤白痢腹痛方 赤石脂 龍骨 地榆 黃連^{各四} 厚朴^炙 人參 當歸 乾薑^{各三}

右八味搗散以飲汁服半錢七日再服之蜜丸以乳汁下三九至七九亦佳此方甚妙以意量之

又療小兒客冷白痢方 人參^{分六} 厚朴^炙 甘草^炙 茯苓^{各四分} 桔梗^{各五分} 檳皮^炙 右六味切以水三升

煮取一升量其大小可一合為度以差止忌如常法

救急療二百日小兒赤白痢日夜五十行方 白朮 乾薑 茯苓 甘草^{各四分} 附子^{二分} 右五味切

以水三升煮取一升分溫服之

必効療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久不差雞子餅方 雞子^{二枚} 胡粉^{錢一} 蠟^{兩一} 右三味熬蠟消

下雞子胡粉候成餅平明空腹與喫可三頓痢止

劉氏療小兒赤白痢方 油麻子^{一握} 右一味搗末以蜜作漿調與服大人亦療之

又療小兒赤白痢咽脹不出方 黃柏^炙 當歸^{分六} 右二味切以水一升煮取六合分溫服之佳

又方 苣荬子 羊肉^{薄切} 右二味以綿裹內下部中不過再差

小兒蟲毒血痢方九首

廣濟療小兒熱毒膿血痢方 羚羊角 地榆 阿膠 赤石脂 黃連 當歸 吳藍 茜根 甘

草 六分 黃芩 分五 右十味切以水六升煮取二升半量大小服之甚妙

又療小兒熱毒血痢方 犀角 分六 地榆 分六 蜜 分三 地麥草 分五 右四味切以水三升煮取二升去滓量大小

服之

又方 葱白 兩三 香豉 合三 梔子 七枚 黃連 兩一 右四味切以水二升煮取九合去滓分服

又療下鮮血方 取梔子仁燒灰末水和一錢匕服之量其大小加減服之

小品療少小熱痢不止梔子丸方 梔子仁 枚五 黃連 連五 黃柏 分三 礬石 燒四分 大棗 四枚 炙 右五味末之

以蜜丸空腹服小豆許七丸差如未除更服忌如常法

古今錄驗療小兒熱痢子苓湯方 子苓 分二 知母 女萎 各六分 竹葉 切八分 黃柏 甘草 各四分 右六味

切以水二升煮取一升分服甚妙

又療小兒痢血犀角擦皮煎方 犀角 分十二 梁州檉皮 二十分 右二味以水三升煮取一升量大小服

之神良 同 羅氏

又療小兒蟲毒痢血蘘荷湯方 蘘荷根 犀角 角 地榆 桔梗 各二分 右四味切以水二升煮取九合

去滓服一合至再服

劉氏療小兒血痢方 地榆 黃柏 黃連 黃芩 各六分 馬蘭子 分二 茜根 兩一 生薑 分三 右七味切以水二

升煮取一升分服大小量與之一合至二合為度

小兒熱渴痢方四首

小品療少小壯熱渴痢八味龍骨散方 龍骨 研甘草 炙 赤石脂 寒水石 大黃 石膏 桂心 桔

萸 各三 右藥搗散以水及酒五合煮散二合量大小分服之效

又療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴唯可飲麥門冬湯方 麥門冬 法甘草 炙各四分 枳實 炙 黃芩 人參

外臺祕要 卷三十六

小兒熱毒血痢方九首 小兒熱渴痢方四首

各三 龍骨^分 右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服

古今錄驗療小兒渴痢擗皮飲子方 梁州擗皮^分 二桔^葉 茯苓^分 八人參^分 粟米^分 右五味切以

水三升煮取一升二合去滓分服量大小與服之

劉氏療小兒痢渴不徹腹脹不能食方 訶梨勒皮^分 桑葉^分 右二味切以水一升煮取五合去滓

分服之亦治大人

小兒疳痢方七首

廣濟療老小一切痢久成疳方 白龍骨^分 黃連 白石脂 雞矢白^分 熟胡粉^分 煮茯苓 阿膠^分 右

七味擗篩蜜丸以飲汁下五九漸加至七九十九大小增減服之^{雞矢一作屎}

又療小兒疳痢渴瘦方 取椿木根^分 粟米^分 右二味以蜜和作丸服五九至七九十九以差為度

崔氏

又療大人小兒久痢成疳方 鼓^升 葱白^分 槐桃葉^分 鹽^分 苦參^分 五青黛^分 右六味切以水三升煮取

一升二合去滓仰臥灌下部中極妙

又療小兒疳痢困垂危方 益母草 右一味煮食之取差止^{崔氏}

劉氏療小兒痢大孔開并有瘡疳痢經四五月吹藥止痢療疳神驗方 黃連^分 麝香^分 右二味相和

以竹筒吹下部中三兩度差止

又療小兒疳痢三歲以上口裡有瘡身壯熱及手足心煩大便極臭即是疳痢方 黃連 黃柏 地榆

炙白頭翁 高良薑 酸石榴皮 生薑 當歸^分 白朮^分 龍骨^分 右十味切以水二升煮取八

合分服大小量之其口中瘡以蘆薈末赤地麥擗末相和塗之下部末蚘蛇膽黃連麝香擗敷之兼以

竹筒吹少許內下部中差止亦主小兒疥瘡

必效療小兒久痢無問冷熱疳痢悉主之方 棗^{一枚} 去核勿令皮^破 右於炭火中燒令如炭於瓷器中

通按墨食
子一名
石子即
石子也

尚德按
參下四
二字行

尚德按
字上疑
勿字

研之以米飲和分服之一歲以下分服之不過三服差王郎中處得之此方傳用甚妙

小兒無辜疳痢方三首

備急療小兒無辜疳痢方 龍骨 當歸 黃連 人參 墨食子 甘草炙 右六味搗散蜜丸服

三九日再以差為度大小增減量之

救急療小兒瘦頭乾無辜疳痢方 馬齒莧 右一味搗絞汁服三合以差止

劉氏療孩子頭乾肚中有無辜者益腦散方 地榆分六 蝸牛分十二 青黛分三 麝香分一 人糞燒 蘭香燒 椒燒 蛇

膽分各一 龍腦香許兩豆 右八味搗散以飲下半錢七量大小與服之忌如常法

小兒諸雜痢方四首

劉氏療小兒腹瀉直從春至秋冬以來不差者方 薤白切一合 生薑 無夷各一 子苓 黃柏 阿膠

芍藥 厚朴炙 人參各二 地榆 當歸各三 香鼓合 右十二味切以煮銀水重濾者一升半煮取九

合分服以差為度秋末冬末如赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

又療小兒痢後虛手足心熱調經未斷亦可服之方 橘皮 生薑各三 右二味切以牛乳半升煎取

四合去滓分溫服之

又療小兒水痢不止方 厚朴炙 黃連各一 右二味切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

又療小兒久痢方 甘草炙 茯苓各六 人參 黃連各四 厚朴炙 生薑各二 龍骨各八 右七味切以水一

升煎取三合欲卧先取鹽麴麝香為小丸內下部中緩服此飲分服甚妙忌如常法

小兒蛔蟲方六首

深師療少小蛔蟲方 桂心分十 亂髮洗 乾薑各六 右三味搗篩為散服方寸七日再

又方 燒桑耳各五 右一味搗散以內於鼻孔中為丸以內亦得

小品療少小未滿百日傷寒身熱嘔逆五味麥門冬湯方 麥門冬去心 石膏 寒水石各三 甘草二分

小兒驚風疳痢方三首 小兒驚風疳痢方三首

桂心分一 右藥切以水一升煎取八合分服效

古今錄驗療小兒鼻衄不止方 以馬屎綿裏塞鼻孔中

又方 燒髮灰末吹鼻孔中亦佳

又方 單服白馬屎汁三合甚良

小兒齒不生方二首

小品療少小齒落不生方 取牛尿中大豆二七枚小開豆頭小許以次注齒根數度即當生千金

又方 取雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千金

小兒頭汗及盜汗方三首

千金療少小頭汗二味茯苓粉散方 茯苓 牡蠣各四分 右藥以粉八兩合治下篩有熱輒以粉頭汗

即自止

又此由心藏熱之所感宜服犀角飲子方 犀角分三 茯苓分四 麥門冬分六 甘草二分 白朮一分 右五味切以

水九合煎取四合分再服即定又加龍齒四分佳

延年療小兒盜汗方 麻黃根 雷丸 牡蠣各四分 甘草二分 乾薑一分 梁米升一 右六味搗粉以粉身汗

即止

小兒顫開不合方四首

廣濟療小兒顫開不合方 防風分六 白朮 柏子仁各四分 右三味搗末以乳汁和塗顫上以含為度千金

同

范汪療少小腦長頭大顫開不合臂脛小不能勝頭三歲不合變藥方 半夏 芎藭各一分 細辛二分 桂心一分

三烏頭枚十 右五味切以清酒四升漬之晬時溫之以絮熨肥顫門上朝暮各二三十日自強急千金

桂一尺又前 半夏一分

尚德按
千金作
下同

尚德按
合下千金
云咸敗色
黃至四五
歲不能行
半夏散方

又按千金
解酒五
尚德按千
金無煎說

尚德按
疑當作

又按到疑
當作頭

千金瘡小兒顙臨方 灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

又方 取猪牙車骨煎取髓塗顙上愈生用亦得

小兒解顙方二首

千金瘡小兒解顙方 蛇脫皮未 右一味和猪頰車骨中髓以塗顙上日三

又瘡小兒解顙三味細辛數藥方 細辛 桂心各一 乾薑各一 右藥搗散以乳汁和塗於顙上乾復塗

兒面赤即愈

小兒月蝕耳瘡方三首

集驗瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡蝸瘡悉差黃連胡粉膏散方 黃連二兩 胡粉 水銀所入各一兩 右三味

搗為散相和水銀研令相得以敷瘡上縱黃汁引成瘡亦以粉之一方有白礬一兩燒蛇床子一兩末

入用甚妙至耳邊到頂上並用

又瘡小兒耳瘡方 燒馬骨灰粉敷之

又方 敷雞屎白佳

小兒臍汁出并瘡腫方一十一首

廣濟瘡小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方 以白石脂一兩研成粉熬令溫以粉臍瘡甚良千金

備急瘡小兒臍中生瘡方 以桑汁塗上使兒就飲之千金

又方 取殺羊乳飲兒千金

又方 取東壁土末以敷之甚良千金云若汁不止燒卷耳子敷之

又方 燒蠟帶灰和膏敷之千金

又兒生百日臍汁出方 燒絳灰敷臍中千金

又兒臍赤腫方 杏仁二 猪牙車骨中髓 右二味先研杏仁入此髓和令調以塗臍上千金

小兒癰腫方百 小兒丹毒方七首

古今錄驗療小兒風臍汁出甘草散方 甘草炙 蜈蚣熟各三分 右二味搗散以安臍中差止甚妙

又療小兒臍中汁差不黃柏黑散方 黃柏炙 金底墨四分 右二味搗和作散以粉臍中即差

又療小兒臍著濕煖鹽豉熨方 鹽 豉等分 右二味搗作餅如錢許安新瓦上炙令熱用熨臍上差止

赤用黃柏末以粉之妙

劉氏療小兒初生至七日者臍欲落封藥方 雄鼠屎七枚 乾薑炙 胡粉三分 麝香許 緋綿灰 右五味

搗研為粉看臍欲落不落即取藥以敷之是以不令風入故也著乾薑恐痛不著亦得

小兒癰腫方二首

千金漏蘆湯主小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癰方 漏蘆用葉一分 升麻一分 連翹 白敏 甘草炙

芒硝和枳實 麻黃去節 黃芩各半 大黃一分 右五味以水一升煮取五合兒生一日以上至七日取一

合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十餘日至三

十日取二合分三服

又五香連翹湯主小兒風熱青腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走遍身中白癰搔不

已方 青木香 薰陸香 沉香 雞舌香 黃芩 麻黃去節 連翹 海藻 射干 升麻 枳實

一分各 麝香半 大黃八分 竹瀝三合 右十四味切以水四升煮取二升內竹瀝煮取一升二合兒生百餘

日至二百日一服三合生二百日至期歲一服五合用麻黃一方不

小兒丹毒方七首

廣濟療小兒丹毒方 青藍汁銚竹瀝 右二味相和分為二三服大小量之一合至三合

千金療小兒數十種丹皆主之搗湯方 大黃 甘草炙 當歸 芎藭 白芷 青木香 獨活 黃芩

芍藥 升麻 沉香 木蘭皮略 芒硝三 右十三味切以水一斗二升煮取三升去滓內硝以綿

搗湯以絹之說則易之取差止

尚德按千金說四升

尚德按千金說以水一升半煎

又按服字下千金有三十日服五合分三服十三日服五合分三服向德按連翹以下五味千金各半兩外各一分錢是二分之說

又療小兒溺竈丹初從兩脇及臍間起走入陰頭皆赤方 以水二升煮桑根皮取一升以浴之
救急療小兒赤丹一名丹溜方 取小豆搗末以雞子白和塗之以差為度千金亦療文丹 尚德按火

毒

古今錄驗療月內兒發丹方 升麻 黃芩 犀角 大黃別柴胡各二石膏分三藍葉切三梔子分八甘草

一分

右九味切以水一升二合煮取八合下竹瀝四合更煎取一半去滓分二服甚妙

又療小兒丹毒方 取慎火草搗以封之差止

又方 搗藍汁塗之又藍泥塗之妙

小兒禿瘡方七首

千金療小兒頭上禿瘡方 取雄雞屎白陳醬汁苦酒和以洗瘡敷之日一度

又方 取不中水蕪菁葉燒灰和猪脂敷之

千金翼療小兒禿瘡無髮苦養方 野葛兩一猪脂 羊脂各一 右三味合煎令消待冷以敷之不過三

上研金

備急療苦頭生瘡白禿不生髮有汁出或無汁乾燥痛方 煮雞子七枚剉 右一味取黃於銅器中急

火熬乾末以敷之取差為度

又方 取春秋桃葉心無間多少搗汁塗之千金并翼治小兒頭不生髮 取桃葉搗汁以敷頭上差

又方 燒鯽魚末以醬汁和塗之止

又方 取臘月猪屎乾末以敷之差為度

小兒頭瘡方三首

千金療小兒頭瘡方 胡粉兩一黃連兩二 右二味為末先洗瘡去垢拭乾敷之即愈更發如前敷之

又方 胡粉兩二白松脂兩三水銀兩一猪脂兩四 右四味合煎去滓內胡粉水銀攪令和調敷之大人同翼

小兒禿瘡方七首 小兒頭瘡方三首

尚德按上
同發當作
同上

尚德按千

金白松脂
二兩

救急療小兒頭瘡經年不差差而後發方 雄黃^研 大黃 黃柏 黃芩 薑黃 雌黃^研 白芷 當歸

青木香^{各四}

右九味切咬咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎候白芷色黃膏成去滓入水銀一兩

以唾於手中研令消入膏攪相得於瓷器中收母以皂角湯洗瘡乾拭以膏塗之日夜再換以差為度

小兒頭面瘡方七首

廣濟療小兒面生熱瘡方 黃連 蛇床子 黃柏^{各八} 胡粉^{分四} 右四味搗散以麻油和塗瘡遍敷之

佳

千金瘡三日小兒頭面瘡起身大熱方 升麻 柴胡 石膏^{各一} 大黃 甘草 當歸^{各二} 右六味

切以水三斗煮取一斗去滓以浴小兒瘡上訖敷黃連散

又療小兒身體頭面悉生瘡方 榆白皮^{燒者用} 右一味搗末以醋和塗之綿覆上蟲出立差亦可以

猪脂和塗之

千金翼苦參湯主小兒頭面熱瘡方 苦參^八 黃芩^二 大黃 芍藥 黃連^{各二} 蛇床子^升 黃柏^五 後

洗^斤 右八味切以水二斗煎取一斗以洗兒日三即差^{千金云治上}

又方 石南草 大黃 黃芩 黃柏 礬石 澤蘭^{各一} 戎鹽^{二兩} 蛇床子^合 右八味切以水七升

煮取三升以絮內湯中洗拭兒日三度差

備急療小兒三歲患頭上起爛漿如釘蓋一二日及胸背皆生仍成瘡方 水銀 硃砂^{各半} 石硫黃^兩

研臘月猪脂 右四味者桑葉湯洗以敷之勿令猪犬婦人小兒等見之無效

古今錄驗療小兒頭瘡面上亦有日益甚者方 黃連 赤小豆^{各等} 右二味搗末以臘月猪脂和塗

之即差止

小兒瘰癧方二首

千金連翹丸主小兒無辜寒熱強健如故而身體項頸結核瘰癧及心腸腹背裡有堅不痛名為結風氣

尚德按千
金韋作散
堅子下有

以水四升
煮取二升
分服日三
夜一異同
但甘草二
分半方後
云多煮洗
瘰癧
尚德按千
金翼大黃
芍藥黃連
各三兩以
水三斗煮
取一斗半
尚德按千
金翼無草
字

核于海藤
丰雨

尚德按侵
疑當作浸
下同
尚德按干
全治黃爛
瘡下同

尚德按其
千金作浸
通按之疑
疑即母足
跟也千金
方有針灸
足跟血
塗泥里煎
法

腫方 海藻三分 連翹 桑白皮 牡丹 白頭翁 防風 黃柏 桂心 香豉 獨活 秦艽各四

右十一味搗篩蜜丸如小豆三歲以飯服五丸至十九五歲以上以意加之

必效瘡小兒項上瘰癧方 以榆白皮爛搗如泥封之頻易

小兒侵淫瘡方三首

備急瘡小兒侵淫瘡方 取龜中黃土亂髮灰各三分研成粉以猪膏和塗之差亦治身赤腫

又方 燒艾作灰敷之同千金

又方 以牛屎燒作灰敷之同千金

小兒蠼螋瘡方二首

備急瘡小兒蠼螋瘡繞身匝即死方 搗疾梨葉敷之無葉子亦可同千金

又方 取燕窠土研成粉以猪脂和塗之乾易同千金

小兒惡瘡方五首

文仲瘡小兒身中惡瘡方 取筭煮汁洗之又燒笋皮作灰敷之

古今錄驗瘡小兒惡瘡方 取豆豉熬令焦黃末以敷瘡差止同千金

又瘡小兒惡瘡面身衆藥所不能瘡之方 取父根洗取汁以浴兒勿使母知良

又瘡小兒面及身上生瘡如火燒方 取黃米一升末以蜜水和塗之差為度

又方 以赤地利搗末以粉之佳

小兒火灼瘡方二首

千金瘡小兒火灼瘡者一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍瘡方 甘草 芍藥 白斂 黃芩 黃連

黃柏 苦參各半 右七味搗末以蜜和敷之日二夜一亦可作湯洗之

千金翼瘡小兒火瘡方 煮大豆濃汁溫洗之差亦令無癢

小兒惡瘡方五首

卷之八

小兒惡瘡方五首

九

小兒風癰瘰癧方五首

廣濟燈小兒風癰浴湯方 柳木空中屑和胡蘿蔔根切二鹽合槌木和 右四味切以水二斗煮取一

斗入鹽以洗浴頭為之以差止

又療小兒壯熱癰瘰已服湯丸不消宜服竹瀝湯方 淡竹瀝二升葛根汁五升牛黃豆粒三

和與兒服一歲至五六歲一合至三合五合再服以意增減之

千金療小兒風癰瘰癧方 胡蘿蔔一防風 羊桃 石楠 秦椒 升麻 苦參 茵芋 芫花一作

炭藥子 蛇床子 黃礬石 枳實 右十三味切以酢漿三斗煮取一斗內礬石令少沸以浴

之

又療小兒風癰瘰癧方 牛膝末酒服方寸七漏瘡多年不差搗末敷之主骨疽癰病瘰癧絕妙

千金翼瘰癧瘰癧方 巴豆五十粒去皮以水三升煮取一升半以綿內湯中拭病上隨手滅神良

小兒疳氣陰癰方八首

小品療少小陰癰白頭瘰癧之神效方 生白頭管根不問多少搗之隨病處以敷之一宿當作瘡二十

日愈

千金療小兒疳氣瘰癧生癰方 半夏 芍藥 茯苓 防風 大黃 桂心 椒 右七

味搗散蜜丸如大豆以湯飲下一丸至二丸三丸日五服以差為度

又方 桂心 地膚子 白木 右三味搗蜜丸如小豆白酒服七丸日三服亦治大人

千金翼療小兒氣癰方 土瓜根 芍藥 當歸 右三味切以水二升煮取一升去滓分服五合

日三

備急療小兒癰方 以蜥蜴一枚燒灰末以酒服之

又方 灸足厥陰大敦左患灸右患灸左各一壯即當差

尚德按千金翼以水二升煮取一升三子及黃字作藥作漿水

尚德按千金翼以水二升煮取一升尚德按三日千金作

尚德按千金翼以水二升煮取一升尚德按三日千金作

古今錄驗療小兒陰癰方

狐陰一具

飛生蟲十四枚

桂心

附子炮

乾薑

蒺藜

硝石一作滑石

細辛各二分

卷柏

桃仁六分

各

右十味搗散蜜丸大豆許以飲下五九至七九再服差止

劉氏療小兒疝氣陰囊核腫痛灸法

如一歲兒患何陰下縫子下有穴灸三壯差五歲以上即從陰上

有穴灸之即愈

小兒陰瘡及腫方八首

千金療小兒陰瘡及腫方

取狼牙濃煮汁洗之

又方

黃連 胡粉等

右二味末和以膏脂油敷之差

備急療小兒陰瘡方

人屎燒作灰以敷之即差千金

又方

貓兒骨燒作灰敷之即差千金云狗屎及敷之

又療小兒歧股間連陰囊生瘡汁出先瘡後痛十日五日自差一月二十復發連年不差者方

灸瘡極

去痂以綿拭令乾以蜜敷麪作燒餅熟即以餲塗餅上熨之冷即止再度差千金

又治小兒陰腫方

猪屎五升水煮沸布裏安腫上千金

又方

灸大敦七壯差千金

又方 搗蕪青葉根薄之

小兒脫肛方六首

備急鸛頭丸療少小積痢久下下後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鸛頭一枚

灸

小形

蛻皮一枚

磁石四兩

桂心三兩

右四味搗篩蜜丸如大豆三歲至五歲服五九至十九日三兒漸大以意

加之千金

又療小兒脫肛方 灸頂上旋毛中三壯即入

又方 灸尾翠三壯愈千金

尚德按無千金作無

通按尾翠當當尾翠

尚德按尾
翠香在尾
尾下與尾
朝別

又方 炙臍中三壯愈

十全金
隨年壯

古今錄驗療小兒久痢脫肛方

東壁土

五分
分鹽頭一
炙焦

五色龍骨

五分
分卷柏四
分

右四味搗散以粉敷之按

內之即差

又方 取鐵精粉敷內之差

小兒蟲食下部方四首

千金療小兒蟲食下部方

胡粉

熬雄黃末
等分

右二味以耆下部穀道中即差

又除熱結腸丸斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛生蟲方

黃連

柏皮

苦參

鬼臼

獨活

橘皮

芍藥

阿膠

二兩
右八味搗篩以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸冬無藍汁可用

藍子

一合

蠶蜜和丸

凡三歲以下服三九三歲以上服五九五歲服十九

又杏仁湯方

杏仁

十五枚
去皮大鹽合

右二味以苦酒一升煮取一半量與服之

又療小兒下部被蟲食大腸赤瘡爛方

水銀

一兩

以漿水煮之取少許以唾研安著竹筒中吹入下部

中三度差

小兒疳濕瘡方六首

備急療小兒疳濕瘡方

以鐵上衣少許內下部中即差

千金

又方 自大椎數至第十五椎夾骨兩傍灸七壯不差加七壯

千金同

尚德按千金本無

此名不可

益以為大腸愈也

又方 艾葉一兩水一升煮取四合分三服差

千金云艾葉切五升以水

又小兒疳瘡方

胡粉

熬八分

猪脂和塗之差為度油亦得

千金

又方

嚼粟子塗之差

千金云嚼粟子
敷之日六七度

又方

羊膽二枚以醬汁和灌下部中猪膽亦得

千金

小兒蚘蟲方七首

小兒蚘蟲方七首

千金療小兒蛇蟲方 棟木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此有小毒

又方 大麻子研取汁與飲之

又方 石榴根一把水五升煮取一升分二服

又小兒羸瘦有蛇蟲方 藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服之

又方 菖蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦佳

又方 東引茅黃根白皮兩四桃白皮兩三 右二味切以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

又方 蕪荑分六狼牙分四白飯分二 右三味搗末以苦酒和量與服之

小兒蛇蟲及寸白方五百

千金療小兒蛇蟲方 取猪膏服尤妙

又方 檮生槐實內下部中差為度

又寸白蟲方 車行石榴根一把水一升煮取三合分服

又方 桃葉搗絞取汁服之

又小兒蟲方 雷丸各分 右二味搗散服一錢匕日三

小兒瘰癧方四百

千金療小兒瘰癧方 塚中石灰研敷之厚著之良

又方 燒桑根灰敷之并燒烏羊角灰和敷之

又療小兒瘰癧方 丹砂 大黃各五兩 雌黃 雄黃 藺茹各四兩 礬石燒如馬齒者佳 莽草各三兩 黃連六兩 右八

味咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸藥末攪凝塗之差

備急若患漏瘡頭盡開出膿夜復合者方 大附子一顆內鯽魚腹中於炭火上燒反研以敷之更搗蒜

以封之良

尚德按千金治小兒蟲

尚德按千金作皮

尚德按千金以苦酒宿次星空腹服之

小兒疥瘡方六首

范汪療小兒疥瘡雄黃膏方 雄黃研 雌黃研 烏頭一枚 松脂 亂髮各一 豬肝一升 右六味和煎

之候髮消烏頭色黃黑膏成去滓以敷之熟塗之

千金疥瘡方 以臭蘇和胡粉敷之差為度

備急瘡方 燒竹葉灰以雞子白和塗之以差為度

又方 以亂髮灰以猪膏和敷之效

救急瘡疥瘡及小兒身上熟瘡並主之方 黃連 黃柏 赤小豆 臭黃各一兩 水銀半兩 右五味

為散以麻油和先淨洗瘡然後塗之甚佳

又療小兒疥瘡等神驗方 黃連 糯米粉各分 水銀八分 胡粉六分 吳茱萸 赤小豆各一兩 右六味搗

散水銀手中和唾研如泥以猪脂并水銀成膏先洗瘡乾拭令淨以塗藥三兩度差忌猪雞肉

小兒癬瘡方六首

集驗療小兒癬方 以蛇子末以白膏和敷之

千金療小兒濕癬方 枸杞根搗末和臘月猪膏敷之一云酢和亦佳

又方 桃青皮搗末以醋和敷之日二

又方 煎馬尿洗之

又方 搗破以牛鼻上津塗之

又方 狗屎灰和猪脂以塗之

小兒誤吞物四首

小品療小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者經久不以為害後病瘦瘠食不生肌膚時下痢或寒熱服諸藥自瘳來反劇不效有師診之云是吞物不消作法服藥所吞物不去終不差令其家中察之云兒近歲常

尚德按瘡
疑當作瘡
又按蘇子
金作蘇

尚德按瘡
疑當作瘡
或是行

尚德按六
疑當作云

弄十六貝鐵珠覺失一顆慮是吞之從來積歲實不以為疑之師六診乃信是故令病矣為處湯藥所患即差復與將療其兒肥膚充悅而忘說其方且記之又有一家女子六七歲許患腹痛其母與摩按之覺手下有一橫物在兒肉裡正平橫爾問兒曰那得鐵在肉中大驚怪脫衣看之內完淨無有刺處按之兒亦不患鐵痛惟覺腹內痛耳其母即以爪甲重重介之乃橫物折爪下兩段亦不偏痛迎師診之其察若吞鐵刺物者其嬰兒時不經鯁礙惟恐養兒時母常帶鐵釧抱橫兒體鐵入兒肌膚中兒縱覺痛啼呼與乳臥息便止遂成不覺今因腹痛摩之知耳鐵得土木濕皆生屑易朽鐵在肉中經數歲肉得血氣皆朽也故介之即折今患腹痛不安但療腹痛服溫中湯下心腹病差後長大緣因產乳不聞道鐵處為患故記之

千金瘳小兒吞鐵方 取磁石如棗核大吞之其鐵立出

又誤吞鐵等物方 艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服之即下

時後療小兒誤吞梅李方 以少許水灌小兒頭承其水與飲之即出良

近效瘳小兒誤吞錢在喉中不出方 取麝炭末指彈入喉中其兒當便咯出妙

小兒瘳瘳方六首

劉氏瘳小兒上冷下熱上熱下冷難將息方 犀角末 甘草 生地黃 各芍藥 白朮 茯苓 梔

子 各三 柴胡 人參 大黃 生薑 各四 黃芩 桂心 各一 石十三味切以水三升煮取一升分溫服

之

又瘳小兒身體滿氣急卧不得方 郁李仁一合搗末和麴漉作餅子如常法與兒喫微利即差

又方 郁李仁末六分以水七合和調去滓煮粥與兒喫之

又瘳小兒由丹赤腫方 括婁三大兩以醢醋搗藥以敷之佳

又方 取蕎麥麴以醋和塗之差

外臺秘要 卷三十六 小兒雜療方六首

又療小兒野雞下痢

按野雞

枳實兩鬼箭青木香

鬼白

兩各二

右四味搗為末以醋醋和

以青布裏以熨之有頭即破熨訖令根拔去之差止甚佳

唐王壽先生外臺祕要方卷三十七目錄乳石論十九門

乳石論序

薛侍郎服乳石體性論一首

李補闕研鍊鍾乳法二首

曹公草鍾乳丸法二首

崔尚書乳煎鍾乳餌法二首

雜餌鍾乳丸散補益法二首

東陵處士鍊乳丸餌并補乳法二首內缺一首

雜餌鍾乳酒法二首

周處溫段侍郎鍊白石英粉丸等餌法并論紫石白石英體性及酒法五首內缺一首

雜煮石英和金銀草華餌及銀鑊煮水飲法三首

同州孟使君餌石法一首

羊肉中蒸石英及石汁無豬肉兼作薑豉服法三首

豬肚中煮石英及飼牛乳兼石英和礮石浸酒服餌法三首

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥案一十條

張文仲論服石法要當違人常性有五乘七急八不可兼備不虞藥并論二十二條

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條 餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條

癰疽發背證候等論并法五十四首

尚德按服
字下疑脫
餌字
尚德按字
字下疑脫
取字

唐王憲先生外臺秘要方卷三十七

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

乳石論序

按古先服餌賢明繼踵合和調鍊道術存焉詳其羽化太清則素憑仙骨若以年留壽域必資靈助此蓋金丹乳石之用豈流俗淺近而能知所患其年代浸深訣錄微密世有傳習罕能詳正更加服石之士精粗不同雖志貪補養而法未精妙遂使言多鄙蕞義益繁無每加披覽實長疑惑既弟子不得親受一家童莫能曉了存諸左右殆謂闕如余宿尚谷神栖心勿藥歲月云久經書粗通知文字之一失乃性命之深誤是以會集今古考量論訣取斷名醫都凡纂要建題篇目并五臟合氣經絡受病入風所中形候論訣兼諸家會同將息妙術及乳石丹與雜石壓理之法錄定倫次即以時代為先後今刪畧舊論纂集新要分成上下二卷可謂價重千金比肩萬古垂之於後學益若冰消者乎

薛侍郎服乳石體性論一首

書中侍郎薛曜論曰夫金石之性堅剛而急烈又性清淨而惡滓穢凡服乳石訖即須以意消息尋檢舊法不可無備忌也但人性或冷或熱或寬或急皆須量性將衛不可輕有犯觸凡乳石一服之後常在腸胃若人氣力衰石氣強即發動若人氣力盛石氣安即強健謹按古法皆令五十以上始服乳石侏謂不然今驗所見年少服者得力速兼無病患何以言者年少筋力滿盛飲食飽飫彌益精明壯健終無發理年歲遲暮氣候衰竭食飲失宜此石氣勝人無不發動悉觀得失莫過於此夫人年少縱不吃飲食血氣自強年老力微縱肉精細猶不可健以此言之足明古法疎矣凡人身血脈經行不絕如血脈微有滯處便於其處發瘡或發熱神氣昏悶必欲防之每朝及暮溫一兩盞清酒或可以生薑刮碎和少菜羹飲之令遍體熱薰薰又作熱羹粥飲之使腸胃通利即石氣流行其初服石一二日百尤宜作此將息是古法

通按硤州
一本作硤
州唐硤州
屬山南東
道硤州屬
河南道

通按千金
翼云置金
銀器中可
鎮心益氣
用

服石不取夏月只取冬月所以然者石有發動與服時皆背此又硃乘通論今驗服石飲食失時勞役過
度立即發動豈待背時今愚見將衛得宜並不發動復見名醫平章服石人之常作熱將息儻發調適乃
易耳脫若石氣發動暫須宣洩服少冷藥便得轉瀉若得通暢熱氣併除若常作冷將息脫若石氣發動
用冷藥無由得轉此一曲之說今古存之但欲廣聞見爾其將息皆須自量本性冷熱為候務取安穩不
可拘執古論捨已從人庶通幽君子以此為意也按本草石鍾乳味甘溫無毒主效逆上氣明目益精安
五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損瘵脚弱痿冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人
有子不鍊食之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇床子為之使惡壯
丹玄石牡蒙畏紫石蒼草少室猶連嵩山也今第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有之唯通中
輕薄如鷲翎管碎之如爪甲中無雁齒光明者為善良擬乃有一二尺者黃色以苦酒洗刷則白仙經用
之少俗法所重亦其貴之謹按鐘乳第一始興其次廣連豐朗柳等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今
硤州清溪房州三澗出者惡林草作亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴只可擣篩白練裏之合諸
草藥酒浸服之耳陶云鐘乳一二尺者謬說也

李補闕研鍊鐘乳法一首

研鍊鐘乳法

取韶州鐘乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不

限多少置鐘乳於金銀器中即以大鍋中著水沈金銀器於鍋中用火煎之常令如魚眼沸水減即添
若薄乳三日三夜即得若粗肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煎滿十日最佳煮
訖出金銀碗其罐內煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止
其有犯者食豬肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無
毒矣即於磁盆鉢中用玉鍊著水研之其鉢及鍊須夾白練袋籠口稍長作之使鍊得轉兼通上下每
日著水攪令調勻勿使者鍊鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入中二免研人竊喫研

通按千金
翼石附注
二兩安

覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復鍊銀鉢四邊研之不及者即粗細不勻為此每日須一開或二開攪括令勻勿使著錠即得勻熟免有粗細研至四五日狀若乳汁研指視之狀如書中白魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落為限熟訖澄取暴乾任將和藥及和酒空腹服佳千金

曹公草鍾乳丸法二首

主五勞七傷肺損氣急瘵丈夫衰老陽氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食服之安五臟補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中方唐尚書 鍾乳二兩別 吳茱萸二兩 石斛各一兩 菟絲子酒浸別

搗

右四味搗篩蜜丸如桐子空腹服七九日再服訖行數百步溫酒三合飲之復行二三百步口胸

內熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常須暖將息不用聞見屍穢等氣亦不用食粗吳陳惡食初服七日內勿為事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患欲多陽事者加雄蛾三十枚若失精加茯苓花三兩佳千金

又鍾乳丸法 成鍊鍾乳二兩 石斛 蛇床子各五 人參 桂心各四 乾薑三兩 右七味

總四十八分計以十二兩以鍾白蜜和之搗三千杵藥成丸如梧子空腹溫無灰清酒下二十五丸日

再服如性飲宜加飲少許仍行三數百步即乳氣溜下任食若能節量甚佳古法云令食乾飯得九力

速如覺熱衝上進一兩口飯行步消息良久任食若能即食甚佳古法云令食乾飯豆醬不得過多不

可依古法終是節食忌行陽事最要能依此法將慎補益之功不可具述終妙也

崔尚書乳煎鍾乳餅法二首

瘵風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力法 鍾乳三兩研如麴以夾綿練袋盛稍寬容急繫頸內牛乳一

大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服為再服亦得若再服即待晚間食消時服之

如能再服即平朝盡服之不吐不利若稍虛冷人即微下少唐利亦無所苦明朝又以一大升牛乳準

前煎之依法服餌其鍊袋每煎訖即以少許冷水濯不使氣不通洩如此三十度以上四十度以下即力盡其袋中滓和麤飼母雞取其生子食亦好不然用浸藥酒亦得若有微服白石英並依此法若患冷人即用酒煎患熱人即用水煎若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之永不發動千金翼同忌

服乳粉法 乳小稱一兩分為兩服朝服夜盡無問多少一準此法一兩為度凡服乳皆須溫清酒服之常令酒氣不絕為佳不得使醉吐唯須少食日食一升許飯得滿三日不出即乳不隨食下化為度三

雜餌鍾乳丸散補益法二首

時顏色不變在土下滿五百年後乃成強壯人通按三日不出謂三日不大便使乳氣不下也

向能按千金息作者二作三磁器留作竟上

又按千金三日三夜夜人吞上有字通按千金有服能之日勿得食生食并忌忌寒等

千金鍊鍾乳散瘵虛羸不足六十以上人瘦弱不能食息百病法能多得常服益佳 鍾乳一斤取白淨光明色好者即任用之非此者不堪用一味先泥一鐵鑊受四五斗者為龜貯水令滿去口二寸內乳著金銀磁器中任有者用之使得沉之於鑊中令水浸器留一寸餘即得常令如此勿使出水也微火煮之日夜不絕水微竭即添成暖水每日一周時輒易水洗鑊并淘乳七日七夜出之淨淘訖內磁鉢中玉鉞縛格著水研之一日一夜多著水攪令大濁瀉取別澄為粉其乳粗者自然沉底可研之凡三日三夜皆細逐小作粉畢澄取暴乾更於銀鉢中研之一日候入水洗不著為佳可分秤入散藥服之取鍊成乳粉三兩 上人參 上石斛 乾薑各三分 右三味搗篩與乳令相得均分作九

貼早朝空腹濕酒服一貼昏黃後服一貼通按千金有服能之日勿得食生食并忌忌寒等 貼六字音黃作黃日午後 三日內準此服之三日後還須準舊服如前盡此一斤乳記其氣力當自知耳不能具述也九龍同

延年祕錄鍾乳散主補虛勞益氣力消食法 防風 人參 各一錢 乳二分 細辛一分 桂心 乾薑 六味為散分作三貼每晨溫酒服一貼食時服一貼食時進水用過飲亦不得過常令飲酒使體中

董董有酒氣若熱煩以冷水洗手面不用熟食亦不得冷忌法如常

雜餌鐘乳酒法二首

纂靈記腫乳酒主風虛氣上安五臟通百節利九竅益精明目補下焦傷竭脚筋疼久服延年益壽肥健
好顏色不老法 鐘乳三兩細研兩重綿鍊袋盛內六升清酒中用白磁器盛密封安湯中煎令三分可

減二分即出湯還添酒滿元數封頭七日取飲一服三合忌如藥法

又和酒服餌鐘乳法 成鍊鐘乳三以無反新熟清酒一斗於不津器中相和密封閉冬七日夏二日空

腹溫服三合日再服漸加以知為度十五日令盡亦有此三兩和酒服三日令盡並令節食忌陽事

雜慎如藥法千金

東陵處士鍊乳九餌並補乳法二首

通按此是鍊乳法其乳法缺

鐘乳無問州土但白薄光潤者即堪以疎布袋盛懸於釜中勿令著底炭火煮之日三度易水出釜水淨
洗訖內釜中發火如前候水色不變為度將乳袋出於新汲清水中洗去乳袋上浮沫更以牛乳五升緩

火煮之一日欲服乳先飲此牛乳任和酒飲之其袋中乳傾出於盤中以水淨洗入鉢即研研滿七日七

夜常添水令如牛乳狀勿令乾燥使粗細不勻候白光可愛水原缺其四色英今不復用謹按白石英所

在皆有今澤州號州洛州山中俱出號州者乃大徑三寸長五六寸者今通以澤州所出為勝採之妙

又經云紫石英味甘辛溫無毒主心腹竅逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹

痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中

輕身延年生太山山谷採無時長石為之使得茯苓人參芍藥共煮心中結氣得天雄黃諸共煎靈亂畏

扁青附子不欲訖甲黃連麥冬第一用太山石色重澈下有板次出雲山亦好又有南城石無根

又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏心有一物如眼吳興石四面有紫色無光澤會稽諸

暨石形色如石榴子先時並離用今散家採擇唯太山最餘處可作丸酒耳仙經不正用而為俗法所重

通按此處缺則處遠陵侍師錄白石英粉并論紫石白石英體性及酒法五首目錄又缺鍊法一首

尚德按千金二作三五字下有六字

也採時依此

又鍊服石英法周司戶處溫傳授云於段侍郎處得其妙
白石英內大微搗碎以醱酢五天升於不津

磁器中蓋頭埋屋北陰處經七十日出瀉除酢搗碎研以水飛如出粉法澄清瀉之更研飛之可經二

七日以醱酢三小升還置不津磁器中蓋頭又埋可經二十日出以水洗去酢味盡研之極細即以好

鹽乳三大升安不津器中重湯煮令乳竭止依方用和後丸

又丸法

生乾地黄

茯苓

主

人參

州蜀下

大門冬

枸杞

上者各三兩

石粉

又酒法

生地黃小切

烏豆

卷二

右二

雅

千金翼煮石英服餌法

石英五大兩澤州光澤無點翳者取石英打碎如小豆蕎麥許大去粗末更於

水中漚洗令淨重鍊袋盛之以繩子繫頭取五大升清水於不津鐵鑊中煮之煮時石袋不用著鑊底

思沙石煎壞先以杖橫鑊口掛石袋著杖上去底三分許煮取一升汁置碗中經宿澄取清平朝

空腹頓服若以此汁煮稀粥服之亦佳每服後可行五百步并飲三盞薑酒又更依前法煮石二十

度者石即無力以布裏地南牆下海三尺深百日又堪用服之然終不如新者

又石英和金銀人參煎服餌法

金剛

銀兩

白石

典

前件藥於金中先下水三大升立一枚入金中令至底水所浸著處即刻記之更下水一大斗七升通

前總三大斗煎之如魚眼沸漸減至枚所刻處即停火急取濕土置符處取其汁貼以不津器中并合

銀石等瀝生收取其人參隨藥汁細細喫為其汁每朝空腹服三大合夜間又服三大合每作食飲

任每服之後隨性多少酒便行藥氣忌如常法

纂靈記銀罐煮白石英服水法

白石並

七五
七六

火氣

通入

內而石又不焦損也

石以銀鑄盛石

受可一小升罐底開小孔令遍側畔近下又兩行開孔遠過於鐵鑄中著水五大升則內銀罐水中於炭火上煎取二小升去罐澄清分再服服訖飲少酒脯行一二百步許其石三遍煎一迴打碎一片作兩片乃至麻米大即休弄之不堪服也無所誠忌

同州孟使君餌石法一首

服石法 粗白石英一大片敲碎顆粒如酸棗核大不用全取白石顆先砂盤中和粗磊磊砂使壯兒仍少著水和投二三千下訖即淨洗取石又於砂盤中和砂更投一二千下依前淨洗即安柳簾箕中高葉兼少許水熟投訖以水淨淘出曬令乾又以手細細投之令淨碎總盡熟投使光滑即盛於夾帛練袋中若出將行若於家內安當門床上每日平明未梳裏前以七顆含於口中以酒或水下之一顆一迴咽七迴吞直令到小腹下以兩匙飯壓著即依大家食一無所忌死生穢惡白酒牛肉但是石家所忌皆總不忌所以辛苦料理使光滑者恐有浮碎薄人腸胃作小瘡子亦無他疑即每日亦起梳裏前依前服之值令熱都總無忌比至日午左側即便轉出為新石推陳石下下訖還依大家食時即餐飯若自知病羸至夜食前又服七顆依前法吞一夜令在小腹下溫齊脚明日平明先使轉陳石總與石下訖又朝法夜法服之此石常在小腹內仍附倉門但小腹溫熱於四肢膀腕頭目腦腦膚體之內元無石氣欲發從何而作丈夫婦人多有積冷若下熱必須上冷若上下俱冷胃口不下食便成消渴致死若上下俱熱頭面生瘡唇乾眼赤手脚枯槁皮毛浮起不久成骨蒸凡人必須上下焦冷熱氣息調和筋脈通達若上熱下冷必有癰積服石之後即下熱自然上冷骨氣堅實腰腎強健萬病自除若不得力十斤亦須常喫若得力訖一斤即止也

羊肉中蒸石英及石汁無猪肉兼作薑豉服餌法三首

羊肉中蒸石英服餌法 精羊肉斤白石英三兩右二味先取肉擘作兩段鑊作孔內石著肉中還相合即用何葉裏又將織紙裏又將布裏於一石米飯中蒸之候飯熟即出却石後取肉細切和葱椒薑等

通按五音
岳蕙書也

通按梓音
半批牛又
凡與育千
曰梓
尚德按七
翼作十

尚德按干
金翼人參
生地黃生
薑各二大
兩

又石汁中魚猪肉餌法

白石英一大兩

右一味絹袋盛以水三斗煮取四大升去石以豬肉一片細切

椒葱鹽豉一如食法煮之任意服隔十日一度打碎煮之一無所忌甚妙

又石英汁作薑豉服餌

白石英

肥猪肉三斤者打作兩塊也通按中破

右二味以水八升煮石英取五升

量煮猪肉得爛熟為度取猪肉汁下葱豉切肉作薑豉食之一劑可六七日喫令盡二兩石英三度煮之第一度全用第二度中破第三度搗碎煮之每煮皆用白練袋盛之其石經三度煮即須換新者一

月以前八月以後皆可作餌也千金翼同

翼千金

猪肚中煮石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首

千金翼諸壯煮石法年四十以下服二大兩年四十五乃至六十以上加二兩常服四月以後服之老

緣石性重服經兩月以後石力若發即接秋氣石力下入其臟腰腎得力終無發理

白石英

二大兩奉
以生絹袋
具淨科斤

重盛縫人參末

生地黃切生薑三細大

葱七莖切細豉抄椒四十九顆

羊肉細切猪肚理一具淨新

粳米一合和餅藥并石葵袁肉著猪肚中煮餅口勿使少乾食及水入

右十味以水二斗煮至八升即停出藥吐著盤上使冷然後

破之如熟破汁流出先出石袋訖取煮肚汁將作羹服之每年二度服每服石英依舊餘藥換之

數一依初法每服隔一兩日不得食木耳竹筍

又石英飼牝牛取乳服餌

白石

三大印取好者以上亦得
德汝千金翼無取好者二

子
尚

右一味搗細研三兩日研了

取一牯牛十歲以上養犢者唯食其佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日卽得取乳每朝空服

熱服一升餘者作粥與任意食之百無所忌以五月上旬起服大好如急要亦不待時節終無發也

冀冀地隨意種菜供服乳人喫之

又石英和磁石浸酒餌法

白石英

五大兩澤
川上好者石

五兩去毛石引鐵多者十兩亦得二
物各熱令碎各用山電泉練袋盛之

右二味以好

尚德按千
全真五六
作六七一
二作二三

酒一斗置不津器中懸藥浸經五六日以後每日飲三兩蓋常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者加之仍隨所加有忌者禁之餘百無所忌一年以後鬚髮變黑腰疼耳聾悉差其酒三五日已後即漸添一二升常令瓶滿所加草藥宜力盡者任換之經三四個月疑石力稍微即更出搗碎還以袋盛經半年以後弃之準前更合

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥菜等一十條

不可食者油脂其性滑腸而令人不食經吃勿驚炙也

又薺芫云發石亦

又蕪荑能生瘡發石氣

又蔓青菜發氣

又芥子及芥菜音能發

若欲食者皆須報鍊雜以葱椒然可通食者蘇其物潤腹而

又冬瓜龍葵此二味甚塵

又蔓青作黃堇和肉作羹始可

又葵不可空吃腹胃燥澀可取

張文仲論服石法要當違人常性五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十三條

五乖

重衣更寒一乖凡人寒衣即暖服石人宜薄衣若重

飢則生臭二乖依更寒經云與極生寒故云一乖

杜即自勞三乖平人飲食不消作生食氣與常人不同故云二乖

溫則泄利四乖平人有所疲極即須消息恬養服石人久坐久

飲食欲寒五乖平人食溫則五內調和服石人食飲欲寒乃得安穩故云五乖

七急

當洗勿失時一急若覺身體酸疼調節強直會發熱煩憤心悶即須洗浴若初寒先用冷水洗頭故云一急

乳石陰陽體性等論并法一十七首

當食勿飢二急須食即食不得忍飢故云二急

酒必溫清令溫三急無問冬夏常須飲多少任性熱尤飲佳故云三急

衣溫便脫四急

食必極冷五急

卧必榻薄六急

食不厭多七急

八不可

冬寒欲火一不可

飲食欲熱二不可

當瘡自疑三不可凡服石常須消息節度覺小不安將息須依法不得自生熱疑

畏避風濕四不可若覺頭風熱悶懷心煩則宜當枕頭以水洗手面即好不比尋常風濕依此无佳

極不欲行五不可若久生久病有所勞極必須便行自勞

飲食畏多六不可

居貪厚席七不可

所欲從意八不可不用從意所違石性將息節度為妙

凡藥石發宜浴浴便得解浴訖不差者乃可餘瘡若浴不差即得依後服葱白麻黃等湯諸隨身備急藥目新附 紫雪 金石凌何也甘草 姜麤 黃芩 大黃 狗白糞 芒硝 朴硝加二蘆根 麥門冬

香豉 石膏 犀角 胡豆 露蜂房 白鴨通 大麥奴 石以上諸藥皆乳石所要仲嗣今與名

醫擇之常用隨身備急

寒食諸法服之須明節度明節度則愈疾失節度則生疾患者不可強強必失身智者詳而服之審而理

之曉然若秋月而入碧潭豁然若春韶而泮冰積實謂美矣凡將理解析法具在中卷參而行之

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十七首

延年祕錄論曰乳者陽中之陰石者陰中之陽乳石從來陰陽精髓處至陰之裏有正陽伏其中正陽之中復在至陰之裏故陽生十一月甲子後服乳陰生五月甲子後服石陰陽發明互相為用而服之皆理

於內不泄於外也夫人膚虛皆帶風氣處人全軀常經含象理之有法則禍害不生乖於時候則危瘵立

至竊覽古法皆云四月服石此謂浮學不曉由來按聞承開服石僉曰四月雖開而未平六月謂得氣之

通按綱鑑
單作成篇

尚德按金
石凌是以
金石煎成
者見千金
翼第十八
卷中

尚德按
院當作東
下句

通按千金
 吳葉黃作
 人參然相
 感志云服
 乳石忌參
 未二說未
 詳孰是
 尚德若按
 服以下十
 一字千金
 大書
 尚德按千
 金鹿子仁
 在李核仁
 後
 又按四兩
 兩千金作
 通按石英
 先發千金
 作附子動
 石英附子
 先發作石
 英動附子

即他皆以此常以不全實其腑不全虛其臟即入風之道無所滯焉或有藥觸成病飲食發病今并論次
 詳而行之通按雖開而未

舊論曰神農桐君深達藥性所以相反畏惡備於本草但深師祖學道洪道洪所傳何所依據云

鐘乳動未令人頭痛目疼木動鐘乳即胸塞氣短海蛤動乳即目疼氣短雖患不同其療一矣如與上患
 相應連服葱白豉湯其五石大散自後人發動將療亦非古法乃云鐘乳與木更互相動本草既無成文

但學者穿鑿今但依頭痛目痛胸塞氣短證候連服葱白豉湯方千金云鐘乳 葱白去青 香豉三升

吳葉黃升 甘草三兩 右四味以水一升半先煮葱白澄清取八升內藥煮取三升分三服訖令人按

摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以暖衣汗出取衣服湯熱飲即便令瀉尚德按瀉 飯醬脯等物任意食

之千金用葱半升豉二升甘草人參各三兩 甘草三兩 桂心二兩 豉升 葱白升 右四味合服如上法

若服此已解師家猶有客熱餘氣復服桂心湯方 桂心 麥門冬三兩 人參 甘草各二兩 葱白兩

豉升 右六味合服如前法出千金

防風細辛動疏黃令人煩熱脚疼腰痛或嘔忿無常或下痢不禁防風細辛能動疏黃而疏黃不能動彼

纔覺發便服杜仲湯方 杜仲三兩 枳實炙 甘草炙 梔子仁枚 李核仁去皮各 豉升 右六味合服如上

法若不解復服大麥奴湯方 大麥奴四兩 甘草炙 人參 芒硝 桂心各二兩 麥門冬半斤 右六味

合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或冷復服人參湯方 人參 乾薑 甘草炙 當歸兩

附子一枚 右五味合服如上法出千金

附子白石英兩更相觸若白石英先發令人煩熱腹脹若附子先發令人嘔逆不食或禁口不開或言語

難手足酸疼初宜服生麥門冬湯方 生麥門冬四兩 甘草炙 麻黃二兩 豉升 右四味切先以水

一斗煮麻黃掠去沫訖內諸藥煮取三升分三服服訖若按摩臥覆取汗候藥氣散溫飯醬菜脯等任

食若熱未退更服大黃湯方 大黃三兩 甘草炙 梔子枚 豉升 右四味切以水九升煮甘草

卷之二十一 雜論 附子白石英兩更相觸若白石英先發令人煩熱腹脹若附子先發令人嘔逆不食或禁口不開或言語

施子取二升半然後下大黃煎三四沸去滓分三服得下便止不下當盡服一法若煩熱加細辛一兩

若熱勢未除視瞻高而患渴復服栝蒌湯方 生栝蒌 大麥奴各四兩 甘草二兩 葱白半斤 豉半升 右五

味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動熱若已解胃中有餘熱復服芒硝湯

方 芒硝 桂心兩二 通草 甘草各三兩 白朮一兩 大棗二十枚 李核仁二十枚 右七味合服如上法若

腹脹去芒硝加人參二兩出千金

人參動紫石英令人心急而痛或驚悸不得臥或恍惚忘誤失性發狂或惛惛欲眠或憤憤喜嘔或差或

劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不動紫石而紫石猶動防風為藥中亦有人參綠防風動人參轉相

發動令人心痛煩熱頭項強攣覺發宜服麻黃湯方千金服後 麻黃二兩 人參一兩 甘草二兩 葱白切一

豉升一大麥奴把 右六味切以酒五升湯三升煮取三升分三服良

又解服人參湯法 人參兩三細辛一兩 白朮 桂心各二兩 豉升三 右五味以水一斗煮取三升去滓分三

服若瞋盛加大黃黃芩梔子各三兩出千金有

若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方石發下

若心有餘熱氣更服人參湯方 人參 防風 甘草各三兩 桂心 生薑切 白朮各二兩 右六味合服如

上法出千金

桔梗動赤石脂令人心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗令人頭痛目赤身體壯熱始覺發宜

溫清酒飲之隨能解須酒勢行則解亦可服大麥麴方 大麥熬令汗出燥止勿令大焦春去皮細搗

篩以冷水和服之入蜜亦佳千金翼云炒去皮蒸

礬石無所偏對發則令人心急口噤骨節疼痛強或節節生瘡將食太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用

生熟湯五六石灌之食少暖食飲少熱酒行步自勞即服麥門冬湯方 麥門冬各三升 豉半升 葱白半斤

右三味以水七升煮取三升分三服覆暖衣汗出即差一法加甘草三兩人參一兩半千金又有桂心

尚德按又
法疑當作
方且此七
字疑當作
上方後文
連書
尚德按各
字千金有
一字
尚德按能
解千金作
能否
又按香子
上千金其
有熱令二
字

二兩云始覺發即服葱白豉湯用葱白半斤豉二升甘草二兩炙三味以水六升煮取二升半分三服若散發身體卒生瘡即服麥門冬湯

銓擇薛侍即等服石後將息補餌法一十五條

薛侍即曰服石之後一二百日内須喫精細飲食羹粥酒等使血脈通利善法取麋鹿尾雄鴨肉等以水洗淨切如指大於鍋中炒令欲熟即多下葱白少下椒鹽熬令香即下少水煮次下梗米摻次下豉清醬汁調鹹酸適口每飲食先須飲十數口羹汁令胃口開通皮膚津潤然後進諸食縱噉炙肉亦無所慮作此將養食多且健縱噉餽飽亦須多噉臠汁

又若覺體氣沉滯石勢不行慎勿喫麴若覺虛懷任餌薯蕷餽飽方取大薯蕷刮去皮薄切日暴乾承潤接作粉不粉者更暴依前接粉訖下篩以煖湯及鹽如麴細切作餽飽肉造臠如前善法用湯餽飽任食此肉補益強筋骨止渴

又若覺渴及熱感慎勿食炙肉羊膾尤惡自外肉性平冷者通食仍勿熱進恐成消渴

又若欲知體實而墮者先着脚拇指甲肉滿及肉色赤是實也實即畏熱發當須服藥微瀉

又若覺四肢筋強背脊重或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴須虛靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎及顙上三五十挽然後乃浴勿令兒風浴訖覆被安卧擬取汗仍須喫葱根葛豉粥法葱根乾葛

城兩豉合葱白一大生薑少許椒十五右六味先以水五大升煮葱根減半去滓下葛及豉煮取二

大升去滓細研少米作稀粥并著葱白等煮熟承熱噉服之訖依前覆被取汗訖令婦人以粉遍身揩摩使乳合半日許始可出外其病立差如不損可重為之

又若覺大熱者可服紫雪或金石凌或絳雪或白雪等但溫半大升水取次研一大兩香湯浴後頓服之候一兩行利熱乃退矣凡此救急紫雪為上如不得通洩宜服黃芩飲子法黃芩大梔子仁七乾

葛兩二芒硝兩半大右四味切以水三大升煮取軟一大升絞去滓下芒硝調之分溫兩服快利即差

止

又若發熱但依法次第將息及服藥後得微汗微利為佳不要多利利多即反損口勢又如虛人

又若覺體氣惛惛不痛不養小便赤澀即搗茅根汁服之

又若口乾即搗蔗汁服之其甘蔗能利大小腸如先利即勿吃甘蔗在下卷口乾法中

又若少覺不下食服生薑汁酒等法 生薑汁合白蜜一清酒倍生薑汁 右三味相和溫頓服之半日乃效

甚佳

又若覺食不下兼嘔宜服麥門冬飲子法 麥門冬去一大兩 甜竹葉一大兩 生薑兩切小麥四合淘 右四

味以水三升煮取一升半分溫兩服

又若不下食體弱乏氣力即宜食鮮鯽鱖法 取鮮鯽魚剝去鱗破去腸血勿洗之但用新布一二尺淨

拭令血脈斷名曰上鱖餘依常鱖法其作蒜薑仍食瓜薑等醬尤益人下食亦瘡氣痢赤痢

又若發瘡及腫有根無根但服五香連翹等湯及丸其法在此卷末癰疽法中 忌食猪肉蒜生菜等唯

宜食兔肉仍須熟喫甚佳

又若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後仍以小艾炷當腫上灸之日一兩炷為佳養如常法

又若觸穢必不善四體慄慄飲食無味亦可含香丸如不瘳服一盞五香湯取微利一行佳則不煩沐浴

也

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條

古今錄驗論曰飲酒則石勢敷行經絡氣力強溢腎氣堅王即頓為陽事陽事過多便腎虛腎虛則上熱

熱盛則心下滿口乾燥飲隨嘔吐胃脘不和宜服葛根飲安穀神除熱嘔止渴也且石酒相得遮相為用

若石勢不行則須少飲如石氣調歇不復須飲

又若熱盛充滿經絡心腹少脹欲心下癰瘕不消或時聚如堅隨後消者宜服秦九湯得利便差秦九湯

通校懷音
可喜喜喜喜
極也

法

秦元

三兩細切

以牛乳一大升煮取一小升去滓頓服之得利即差若老弱可量氣力進之其飲食亦宜

清冷不得渴熱濁熱則使石氣壅塞不行喜嘔吐病堅結也亦能發黃或小便赤心堅痛者亦宜服秦元湯得溼泄差熱氣散後黃已縱微皮膚是差候勿怪熱散後慄慄寒顫若困顯黃復出外者是謂餘熱欲散也勿厚覆但使肌膚中少寒顫即止

又若熱解寒不解者可飲三合熱酒使解

又若寒解後頭重耳鳴滿眼漠漠心下痛者可飲二合許清酒便差寒溫宜依此法

又若心下結硬腹脹大小便不利者急服前胡大黃湯下之法在下卷小便淋法中

又若欲狂癲失常者與白薇湯下之法在下卷痰癖乾嘔法中

又若酒熱歇石熱亦不復行心下熱結已消黃縱未歇亦無所苦但冷飲食勿進辛辣菜及熱補食若不

欲進清冷者可和暖餌勿令大熱

又若飲熱歇後石勢虛損飲食入口自覺諸脈中瘡瘡如冷水入者是酒石俱退經絡空虛故也宜積口

調冷食兼依服進諸蹄羹通養諸脈自差止

又若頭眩耳聞空中有人語心怯恐懼兼憂悸不安四肢如痺或起眠即輒驚如被虎狼所逐威勢所攝者方服淡竹瀝一二升乃至三升差止亦可進白薇湯下之消息稍與令飲粥常令有食力時進雞心

酸棗湯常令對偶安慰之以美言相悅慎不可以惡事驚之

又雞心酸棗湯療後陽多腎虛發熱日不食胃中虛熱飲食不已氣入百脈心臟虛甚令人失常法

出古今錄驗

雞心

十枚

酸棗

升半

茯苓

二枚

枳實

炙知母

甘草

炙

桔梗

二兩

生地黄

右十一味切以水一斗煮取半斗內心者取三升冷分三服

餌寒食五石諸石等解散論并法四十九條

小品論曰凡服五石散及鐘乳諸石丹丸藥後忌食辛熱度觸動多端發狀雖殊將攝相似比來人遇其證專

尚德按
疑當作

通按此門
內有四
五條與
金翼大
其文有
異者
尚德按
手巾
作布手
巾

通按酒字
當飲字
尚德按
飲
酒二字
互錯

執而療之或取定古法則與本性有違或取決膚醫則昧於時候皆為自忤遂推石過深省其理未曰合
宜每尋古醫互相晦見直言沐浴實未探微寒溫適情蓋煩留度隨時之義易所通焉故陶正白云昔有
人服寒食散簡古法以冷水淋身滿二百罐登時殪斃又有取汗乃於狹室中四角安火煩更則煩據茲
將息豈不由人迫之昔事守株何甚令列藩章幸擇長而錄用耳寒食藥得節度者一月輒解或二十日
解堪溫不堪寒即已解之候也其失節度者或頭痛欲裂為服藥食溫作解宜急下之

又若手脚卒患頑癬者為犯熱經久故也急與冷水洗飲熱清酒進冷食即止一法飲冷清酒亦止
又若體上生瘡結氣腫痛不得動者為自勞太過也宜服香豉飲法 香豉升三葱白口一處 右二味以水

三升煮三沸服之不止乃至三四劑自止

又若腰痛欲折兩目欲脫者為熱上肝膈腰腎冷極故也宜服黃連飲法 脫痛欲折兩目欲
草一兩各姜糖而 右三味切以水三升煮取一升去滓內朴硝一兩頓服得微利止 黃連 甘

又若眩胃欲倒者為衣厚犯熱故也宜冷水淋頭并洗之須臾即愈 金翼云宜針頭冷水洗 尚德
又若脚疼欲折者為久坐溫處故也宜常須單淋行役并以冷水洗浴即止

又若腹脹欲裂者為久坐下熱衣溫失食故也宜數冷食冷洗當風取冷須臾即差

又心痛如刺者為應食不食應洗不洗寒熱相擊氣結不通填於心中故也宜數飲熱酒任性多少酒氣
行經絡通達淋以冷水又冷淹手中搭著苦處溫復易之須臾解也解後仍速與冷食食多益善於諸痛
之中心痛最急宜速救之法在下卷心痛法中

又若發急遍身熱如湯火或氣結不識人時倒口噤不開不自覺知者救之要以熱飲隨其性酒之卒不
得下者當打去齒灌之咽中塞盛酒入必還出但灌勿止半日許以酒下氣徹乃蘇酒卒不下者難可救
矣

又若下痢如寒中者為行止食飲犯熱所致宜速脫衣冷食冷飲冷水洗即差

尚德按千金其云若不可更下乃止

尚德按千金其作症

又若百節酸疼者為卧處太厚又蓋覆被衣溫不脫故也但單牀薄被單衣或以冷水洗勿著新衣著故垢衣雖冬寒常須散髮受風仍以冷石熨其衣勿繫帶若犯此酸悶者急入冷水浴勿忍病而畏冷兼食冷飯

又若脫頭惡寒或發熱如溫瘧者為失食忍飢失洗不行又食臭穢故也宜急飽冷食冷水洗數行即愈又若惡食臭如死物氣者為食溫作瘳故也宜急以三黃湯下之若不下終不差法在下卷解壓法中又若咽中痛鼻中塞涕涕出者為衣溫近火故也但速脫衣取冷當風以冷石熨咽鼻當自差不假洗也又若胸脇滿氣上嘔逆者為飢而不食藥氣上衝故也速與冷水洗食冷飯止

又若食便吐出不得安住者由瘳故也宜急以甘草飲下之不下當危人命爾甘草飲法 甘草二兩大黃三兩黃芩二兩右三味切以水三升煮三兩涕去滓分服以利為度

又若大便秘腹中堅如盤蛇者為犯溫積久腸中有乾糞不去故也宜銷酥蜜膏服一二升津潤腹內即下若不可服大黃朴硝等下之

又若患淋者為久坐溫處或乘鞍馬坐處太熱熱入膀胱故也但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即差止千金翼云若不止可下之不下殺人命

又若寒慄頭掉不自支持者為食少藥氣溢於肌膚五臟失守百脉搖動與正氣相脫故也宜強飲熱酒以和其脉強食冷食以定其臟強行以調其關節強洗以宜其權滯即差

又若小便稠數者為熱食及噉諸熱餅肉之屬故也宜冷水洗服兼服梔子湯法 梔子仁二兩甘草炙芒硝下黃芩各二兩右四味切以水五升煮取二升分溫三服取利即差

又若失氣不可禁止者為犯溫不時洗故也但冷水洗之即差

又若遺糞不自覺者為熱氣入胃大腸不禁故也當冷洗即差

又若目痛如刺者為熱氣衝肝上眼故也但數冷食清朝溫小便洗之不過三日即差止

又若耳鳴如風聲又有汗出者為自勞過度陽事不節氣上耳故也宜數飲食補之節禁陽事即差

又若口中傷爛舌強而燥不得食味者為食少穀氣不足藥氣積在胃管故也宜急作豉湯服之豉湯法

香豉仁姜麴甘草二兩麥門冬法小柏兩右五味切以水六升煮取二升分溫三服能頓服益

佳再合為度

又若爛節強直不可屈伸為久停息不自勞洩藥氣不散漸侵筋血故也出力使溫冷洗即差止

又若得傷寒溫瘧者為犯熱故也宜以常療藥救之無咎但勿服熱藥耳其傷寒瘧等皆除熱破癖不

與寒食相妨故通服也凡服寒食雖已熱解而更病者要先以寒食救之終不中冷其法在下卷解壓法

中

又若飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗之復寒其者數十日輕者數十晝夜不得寢寐悲志

怒有驚跳悸恍惚忘誤者為犯溫積久寢處失節食熱作癖內熱與藥併行寒熱交爭雖以法救之終不

可解也昔皇甫氏曾餌此散每發即欲自刑尊親制之乃免斯禍強令飲食其熱漸除縱家有寒熱藥發

急皆忘雖素聰明發皆頑冥告令難喻為茲覽者不可勝數遂簡家兄士元救急之法合三黃湯服之大

下便差止而錄之法在下卷解壓法中

又若脫衣便寒著衣便熱為脫著之間失適故也小寒自可著小溫便可脫即止洗之則爽然差慎勿忍

之使病成也小品云洗則了然差矣應洗勿忍之忍則病成也

又若齒斷腫唇爛牙齦搖痛頰車響為坐犯熱故也宜時救之可當風張口使冷氣入咽漱寒水即差

又若脈洪實或斷絕不足似死脈或細數弦駛其所犯非一此脈無醫不識也熱多則弦駛有癖則洪實

急痛則斷絕凡寒食藥熱卒常如此自無所苦非死唯勤節度為妙

又若大便稠數為坐久失節度將死之候也如此難療矣可與前大黃黃芩梔子芒硝湯下之僅十有一

生耳可為必死之療不可不利致死令人恨也

又若人已困而脈不絕為藥氣盛行於百脈人之真氣已盡藥氣尚有行故不絕非生氣也死後體因溫如生人肌腹中雷鳴顏色不變一兩宿乃作死人也

又若周體患腫不能迴轉者為久生不行又不飲酒藥氣滯在皮膚之內血脈不通故也宜飲酒冷水洗自勞即差若不能行者遣人扶持強行使肢節調暢乃止亦不得令過度使反發熱或發熱者還當洗之
又若食患冷不可下者為久冷食口中不知味故也當作白酒糜多著蘇熱食一兩頓若小悶者還令冷飲食即差止

又若下部臭爛者為坐薦席厚熱故也當坐冷水中即差

又若夜眠不得睡者為食少熱在內故也服梔子湯方 梔子仁十四枚 大黃兩三 黃芩兩二 右三味切以水

五升煮取三升去滓分三服微利又當數進食食自得眠睡

又若嘔逆咽喉中傷清血出者為臥溫及食熱故也但飲冷水冷石熨咽喉即差

又若藥發輒安臥不與人語者為熱盛食少失其性故也但與熱酒冷洗冷食自勞便差千金翼云藥發輒安臥不識人

由熱氣盛食少不充即性正性故也

又若四肢面目浮腫者為飲食溫久不自勞力藥與正氣相隔故也但飲熱酒冷食自勞洗浴即差千金翼云

藥氣與正氣相併

又若鼻中有氣如蝦雞子臭者為著衣溫故也或陰囊臭爛為坐熱故也入冷水中即差宜脫衣洗浴即自差

又若卒目暗無所見者為飲食居處太溫故也但脫衣冷洗冷食須臾差止

又若身肉痛痛無常處如遊風者為犯熱所作非風冷也宜冷洗宜冷石熨之自差

又若服藥心悶亂者為服溫藥與疾爭力故也法當大吐如或不吐病當至死若吐不絕可食冷食飲自然差也若絕不識人口不復聞者亦當斷齒以熱酒灌之入咽吐出者更與之但得酒氣下通不半日即

便蘇矣

又若嗜寐不覺者為久生熱悶故也宜冷洗冷食即差

又若肌膚堅如石不可屈伸為熱食溫卧作癰五臟隔閉血脈不通故也急服前三黃湯下之食冷食飲

熱酒自勞即差

又若臂脚偏急痛苦者為久生卧溫熱不自移轉氣入肺脾胃故也宜勤以二布巾淹冷水搭之覺溫則

易如此不過三日即差

千金翼云無入
附背故也

又若患腹背熱如子如杯如盤許大者以冷石隨處熨之又若脚指間生瘡者為履襪大溫故也當以脚
踐冷地以冷水洗足差

又若口熱痛煩悶者方 生雞子_五 右一味頓服之即便愈

癰疽發背證候等論并法五十四首

夫二儀含象三才贊形五體以類於五行六腑乃同於六呂人之肉也則脾之所主人之皮膚則肺之所
管膚肉受病皆繇滋味而與衣服衣服厚暖則表之呼寒滋味失度則腑臟皆熱腑臟既擁則血脈不流
血脈不流則毒氣偏注湊於俞穴俞穴之所陰陽會津承虛伏守必者其血敗即潰肉腐而成膿實
則為癰浮則為腫也若兼腎肝虛熱遂成疽成癰矣且疽則附骨癰則著筋凡曰癰疽脈皆有狀有浮有
滑有數有澀有鈞有沉浮為陽虛滑為陽實數為陽燥澀為陰寒鈞為陰虛沉為陰堅三陽三陰之脈也
若三部之中脈有一陰一陽復結為失常經者癰疽之候也且脈法心洪肺浮肝弦腎沉若肺肝心俱至
即發癰疽何以言之為一陰一陽水火競焉舊論寒熱客於經絡血澀不通其理乖也論熱盡發於內而
形於外未有外熱能入於內而成其腫皆繇表虛客寒所搏故衣厚暖呼其寒是其義也凡癰發生皆繇
自召一呼吸失度二喜怒不調三飲食不節四陰陽乖候犯此四者則六腑不和榮衛不利榮者血也衛
者氣也血傷寒則氣傷熱則氣傷則為火血則為水水火相搏遂形癰疽故加虛則氣振心愜四肢顫

凡人強壯之年。陽氣省皮膚疏薄。滋味。性情陽胃壅塞。因壅發熱。即受其寒。寒氣總至。受有深淺。隨處為證。淺即內陽尚壯。中即少虛。深即虛竭。病在陽。即易去。在陰。即難除。其有決生死之神功。辨形色之宗旨。明劉涓之術錄爾。

凡癰疽膿出後不可瘡者有五
一、眼白睛青黑而小
二、咽藥而嘔
三、傷痛渴甚
四、腠項中不仁
五、音嘶自奪此為極也

又凡食諸生果皆召其病養生法云勿食不成核之果勿食和汚粒之食昔乃蒼蘿畧爲綱舉以曉將來

千金論曰凡發背皆緣服五石寒食更生散所致亦有單服腫乳而發者又有生平不服石而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至不救及其臨困時瘡方圓徑三四寸高一寸兼有數十孔以手按之諸孔之中膿皆反出尋即失音不言所以養生者小覺背上痛癢有異即取淨土水和作泥捻作餅子徑一寸厚二分貼著瘡上以粗艾大作炷灸之一炷一易餅子腫若粟米大時可灸七餅即差若如榆莢大灸七七炷即差若至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈

又五香連翹湯方 青木香 沉香 獨活 連翹 干麻各二兩 芍藥半斤 附子六兩 黃芩四兩 甘草八兩 水煎服之

大黃
別三兩
漬淡竹

滙
升二
雞舌香

秦寄生 通草

卷二

雨 廣 雨

重刊
著亦得

射干
法二
一兩

滌更煮取二升分溫三服甚佳

至千金本方有丁

雨
石

十三

水九升煮藥待

水減半後內竹

又五香丸療心腹鼓脹冷瀉鬼氣瘧忤方亦名沉

兄水香

卷之五

卷之四

五

角
肩刺
取
董陸
晉

楊子仁

起

各
一
青
教
日

重刊

一

廣行

外臺心

卷之四

卷之六

1871

卷之四

卷之五

卷之五

取三升
尚德按服
疑作蠟

陳

黃芩

肉桂

芍藥

茯苓

巴豆

各三兩去心皮

今雙色制師如脂

大黃

二

右二十三

味搗篩蜜和更搗一

千杵封以油膩紙無在有患時溫熱症病鬼瘧病心腹鼓脹疽瘡垂欲死者可服四五九九如梧子大

或至六七九但取三兩行快利為度利止即差

又療發背腸癰乳癰一切毒腫服之腫化為水神驗方

犀角

屑十分

大黃

五

蜀升麻

梔子仁

黃芩

防風

蜀當歸

甘草

炙

薑薑

人參

黃連

黃耆

各四

巴豆

二十兩去心

右十三味搗篩蜜和

為丸初服十九取快利三兩行如不快利更服三兩九以快利為度若利多以冷酢飯止之以後服每

減九常取瘡利腫消乃止

一方有

又療一切腫初覺痛不可忍神效方

取麝香如十指許粗繞腫令匝滿中布生椒又以一片麝香可板上

蓋之當中以艾炷如酸棗大灸之蓋麝香欲焦即換著新麝香痛停止

又療風毒及一切腫塗散方天后賜會稽王岑十六遂於嶺南見郭詡騎馬患腫發背會稽與蘆黃門等

親與藥須臾平復岑侯因得此法

大黃

兩

白飯

三

寒水石

紫葛

青木香

各一

兩

硝黃

黃芩

各二

兩

節好肉處移取腫搗即消

又方汝陰靈明府說傳云甚驗

水銀

二

右一味以紙分為兩裏密繫頭更以帛重裹物令走失遮互

將搗上覺溫即易不過十數度熱毒盡散即消矣神效

又發背神驗方

狗白糞

二

右一味覺欲作腫者以煖水一升絞取汁分再服以滓敷上每日再為之

差止

又方凡腫起背胛中頭白如黍粟四相連腫赤黑令人悶亂者名發背也宜禁陽事酒蒜與麝若不安

療即入內殺人可當瘡灸七八百壯有人不識多作雜腫瘡者死

又方取三年酢滓微火煎和牛脂封上日一易之

尚德按酒
字下千金
有肉字

通按十全
皆可封日
三四易
通按散急
方云猪羊
脂作片冷
水浸貼
易之五六
十片差初
帖即寒寒
定針眠舒

尚德按十
金龍卷一
而片藥以
下六味各
二兩

尚德按十
金背由太
作此由大
山菜黃以
下四味各

又方 取亂髮及酒服一方寸匕亦治癰疽

又方 狗牙反酢和封之差

又方 飲鐵漿三升下痢即差尚德按三千金作二

又方 猪羊脂封之亦療乳癰千金作二

又方 鹿角反酢和塗之佳尚德按鹿千金作鹿

又療石氣在皮膚腫熱膏方 生麥門冬法姜豉 鼠李皮 石膏碎凝水石 沙參各一青箱子露

蜂房各一竹瀝 杏仁油各一牛酥兩大 生地黄汁各三 右十二味切內酥油灑中微火上煎令魚眼

沸一炊久膏成覺有熱處即摩之差止

又療發背及癰疽潰漏并未潰腫毒方 桔萐 榆皮 胡燕窠 鼠坐土 女人潮信帛水洗 右五

味等分潮信汁和如泥塗腫上乾即易之潰者四面封亦覺即封之三五日差

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方 防風 茯苓 白芷 桔梗 遠志法甘

草及人參 芍藥 當歸 黃耆各一桂心二附子厚朴二赤小豆 右十四味搗散酒

服一方寸七日三服夜一服

又排膿止痛利小便散方 瞿麥兩芍藥兩赤小豆微桂心 芍藥 麥門冬法白斂各二黃耆 當歸

各二 右九味搗篩先食溫酒服一方寸七日三

又療癰腫令自潰長肉意苡仁散方 薏苡仁 桂心 白斂 當歸 肉苁蓉 乾薑各二 右六味

搗篩為散先食溫酒服一方寸七日三夜再之

又療諸虛不足發背及癰疽差後經年復發背由太風聚結毒氣在內閉塞得夏月出攻背不治積聚作

膿血或為內漏內塞排膿散方 山茱萸 五味子 茯苓 乾薑各六當歸 石葦法芍藥各四附子

二分肉苁蓉 巴戟天法遠志法麥門冬法乾地黄法八莖絲子酒地麥各三分石斛 人參 甘草

六兩地參

尚德按干

金無已漬

二字人參

以下三味

各一兩日

七八服夜

二服以

多為善方

後之最詳

尚德按干

金黃者黃

連芳藥各

三兩澄清

取二斗煮

取一斗口

又按唐說

當作痛

尚德按干

金八味各

二分

尚德按干

金雄黃半

又瘡癰疽發背婦人發乳諸癰已潰未潰者便消不消者連清疾愈內補散方 木占斯 敗醬 細辛

乾薑 厚朴 炙桔梗 甘草 人參 法二兩 桔梗子 防風 右十味搗篩為散酒服方寸七

日三夜二開食長服去敗醬

又瘡癰疽發背猪蹄湯方 猪蹄一黃耆 黃連 芍藥 黃芩 三 薑椒根 狼牙 右七味切

以水三斗煮猪蹄令熟澄取三升漬諸藥煮取一升洗瘡一食頃著帛拭乾著生肌膏日二生痂止瘡

痛者加當歸甘草各二兩

又蝕惡肉散方 馬齒礬石 藜蘆 麝香 研丹砂 雄黃 雌黃 白礬 硫黃 右八

味細作散敷之先蝕惡肉今盡即封生肌膏

又癰疽蝕惡肉膏方 大黃 附子 桂枝 芍藥 芎藭 雄黃 雌黃 真珠 白礬 白礬 雄黃 右

簡始略二 右十一味先以猪膏一升半煎六種草去滓內簡始礬石末絞之塗瘡中惡肉盡即止

又散方 簡始 礬石 雄黃 硫黃 右四味為散內瘡孔中惡肉盡止勿使過好肉也

又瘡癰疽發十指或起膀胱及發背去惡肉方 猪蹄如餌法當歸 大黃 芎藭 芍藥 黃芩 獨

活 莽草 右八味以水三斗煮猪蹄取八升汁內藥煮取四升去滓洗瘡兩食頃拭令燥以後

麝香膏封之

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背去惡肉方 麝香 礬石 雄黃 真珠 右四味以猪脂攪

令如泥塗惡肉盡即止更敷生肌膏

又生肌膏主癰疽發背已潰方 甘草 當歸 白芷 椒目 乾地黄 細辛 續斷 烏喙 椒

去肉從容 三 薤白 蛇蛻 右十一味切以好酢半升和漬一宿取膏三斤微火煎之令魚眼

沸三上三下候白止黃膏成用塗之佳

參各二兩
 烏家六分
 無餘附
 通按千金
 名竹葉黃
 者為有黃
 麥作十四
 尚德按千
 金名黃省
 竹葉湯治
 瘰癧發背
 黃香來門
 冬各三兩
 有黃茶三
 兩以水一
 斗一升先
 煮竹葉取
 一斗
 尚德按千
 金名五利
 湯黃茶二
 兩分四
 服
 尚德按千
 金名大黃
 牡丹為要
 器同芥子
 半升作水
 子一升要
 器瓜子半
 升益硝二
 兩以五水
 升煮取一
 升頓服要

又瘰癧背癰腫癰黃湯方 黃耆 人參 麥門冬 石脂 芫花 當歸 生地黄 甘草 芍藥 各三兩 生薑 五兩 大棗 三十枚 半夏 四兩 洗 竹葉 一握 右十三味切以水一斗煮竹葉取九升去滓內藥

煮取三升分四服日三夜一

又瘰癧石之人患瘰癧等輩服牛旁方 每吞三服
 又方 每食訖含生乾地黃丸如梧桃大除熱補益也

又瘰癧四十以上強壯常熱發瘰癧無定處大小便不通大黃湯方 大黃 黃芩 各三升 麻仁 一升 芍藥 一升 枳實 一升 右五味切以水五升者取二升四合土摩下芒硝令調分三服得利為度不過三劑即

瘰癧蟲蟻如泥塗腫上不過三度即合口甚妙
 又主腹內癰方 大黃 四兩 牡丹 三升 芥子 升 硝石 三升 桃仁 五十枚 右五味切以水六升煮取一升五合

分再服膿即下無膿若下血
 又若大熱背腫身多生瘡下諸石方 露蜂房 六兩 木緋帛 一尺 亂髮 二升 麻仁 一升 右四味先用

緋帛裏蜂房等以麻纏使過於炭火上燒令烟盡及熟搗碎作餅反鋪之取末候熱時空腹酒和服一
 方寸七日再服此藥五六日即常以小便及大便下青黃赤汁及黑物極滑而腥臭者此石下候三五

度下即休若多惡令瘦損若不大急困但煮五加木汁服亦療丁腫
 又瘰癧背上初欲作腫方 大黃 升麻 甘草 黃芩 各三升 梔子仁 一升 右五味切以水九升煮取二升

半分服快利便止不下便進
 又凡發背為癰疽腫已潰未潰方 香豉 三升 右一味少著水和熟搗如強泥作餅子厚三分依腫大小

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

貼之以艾布其上灸其鼓餅使溫溫熱而已勿令破肉也若熱痛急易之或一日二日灸之若先有瘡

外臺祕要卷三十七

孔勿令鼓餅蓋却但四面著炙孔中汁出差止

又瘡惡瘡腫著陰洲或偏著一邊疼急變痛牽入小腸痛不可忍一宿殺人方 茴香草 右一味搗取

汁飲一升日三四服又取澤敷腫此外國神法從元嘉末來用之神效起死人

又生魚薄主乳癰方 生鯉魚振大 大黃 莽草 竈中黃土各六 右四味別搗更和膏三味下篩更

搗令調以生地黃汁和敷腫上日五六夜二三即愈

又瘡動散背腫已自利虛熱不除宜服竹葉黃耆湯方出古今 竹葉切三 黃耆兩 小麥升 芍藥兩 甘草

二兩 石膏研一兩 人參兩 升麻兩 茯苓二兩 桂心六分 當歸兩 乾棗十四 五味子兩 生薑兩 乾地

黃兩 麥門冬三兩 知母兩 右十七味切以水一斗二升煮竹葉小麥取九升去滓內藥煮取三升溫

分四服

又商陸貼諸腫方 商陸 黃芩 黃連 白芷 白斂 大黃 莽草 白芨各二 右八味搗篩消

膠汁和如泥塗紙貼腫乾即易之

又有患癰破下膿訖著足藥塞瘡孔乃瘡痛煩悶困極有人為去兒藥以楸葉十重以布帛裏緩急得所

日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於受法貼此主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當

早收之臨時以鹽湯沃令潤用之亦佳薄削楸白皮用之亦得

又梔子湯主表裏俱熱三焦壅實身體生瘡或發癰癰大小便不利方 芒硝湯成 甘草二兩 黃芩 知

母各三 大黃四兩 梔子仁枚 右六味切以水五升煮四味減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝

分三服

又瘰癧疽發背後小瘰癧李根散方 李根切一 甘草炙 桔梗 黃芩兩 葛根 當歸各三 桂心 芍

藥各四 蒼朮六 通草 白斂 厚朴炙 附子一兩 栝實子半 夏一升 右十五味搗篩為散酒服一

方寸七日三瘰癧大瘰癧若夜再有人發背骨出十餘即服此即差

器同但用 水六升內 芒硝與臈 尚德按十 金取三升 分三服便 連作更進 尚德按十 金取三升 又按元嘉 說見第三 十卷中 尚德按十 金甘草三 兩梔子仁 二十枚 尚德按十 金後作及 少二字結 梗黃芩各 一兩當歸 二兩芍藥 六兩栝實 子作栝實 根半更各 五兩云有 人患背成 瘰癧云云 尚德按十 金栝實黃 芩人參乾 薑各二分

以心一分
向總按十
金無未清
二字二參
一兩桂心
二兩
尚德按此
方及前後
文與十金
大異外合
全錄單字
金方字
二十四卷
中所引者
是
又按翼廉
字下有清
及二字絕
字下有不
可忍三字
作法方無
赤小豆下
末字請諸
藥作字末
之合四字
日三夜二
作日夜各
五三五日
作三日春
作告

又主癰疽發背方 蜀椒汗 黃苓 人參略 乾薑 附子炮 白斂 防風 桂心 甘草各一兩 芎藭二兩
赤小豆一合 右十一味為散酒服一方寸七日三夜再服之

又內補散癰疽發背已清未清排膿生肉方 當歸 人參略 桂心 芎藭 厚朴炙 防風 白芷 桔梗 甘草各一兩 右九味為散以酒服一方寸七日三夜再服未合服勿停

又瞿麥散主諸癰未潰瘡中疼痛膿血不絕法 瞿麥 白芷 黃耆 當歸 細辛 芍藥 芎藭 薏苡仁 赤小豆一兩 右九味先以清酒一升漬小豆出銅器中熬之乾復漬清復熬五遍止然後

搗諸藥下篩酒服一方寸七日三夜二服三五日後痛者養肌肉生一法以春酒漬小豆多痛倍瞿麥 痛未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡仁芍藥甚妙

又黃耆散主癰疽撮膿方向總按千金無此方見翼白斂三分下兩 黃耆五分 赤小豆一分 芎藭二分 芍藥三分 白斂三分 括婁三分 便 右六味搗散酒服方寸七日三服之草三分 右一味

以水三大升者令爛絞去滓更盛於磁器中重湯煎之使如稀糊以塗爛帛貼腫上熱則易之驗

尚德按諸
石之諸疑
衍

唐王壽先生外臺秘要方卷三十八目錄乳石下八門

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

石發熱救衝頭面兼口乾方六首

石發兼虛熱痰癖乾嘔方五首

石發吐血衄血方七首

石發熱煩及渴方一十六首

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

諸石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

石發熱目赤方一十首

石發瘕結大小腹留墮老小虛羸方六首

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

石發兩脚卒冷兩胛腋卒熱并口噤方三首

石發苦熱解折下石方四首

服石後將息飲食所宜法二首

紫縛既并食飲將慎法三首

服石後防慎忌雜藥等一首

唐王靈先生外臺秘要方卷三十八

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十二首

尚德按梓
疑當作梓

論曰夫乳石之性緩而且速能悍風寒遂暑濕導經脈行飲食之氣在陰即補其不足在陽即能發其炎陰盛陽虛則二儀亢位所以炎上府之受邪則表熱氣隔至陰之伏也脈形陽浮而數陰伏而沉理之於經自然通泰若炎之於孫絡即血脈過流或全抑之則乖於石性理而兼助則表裡周榮若遇小發可自勞力按摩不可即治熱不已者別法於隨事擇用解散方

瘡寒熱胸中塞面腫手足煩疼是鍾乳發宜服生麥門冬湯方 生麥門冬 去心 四兩 豉 三升 葱白 切 半 右

三味以水八升者取三升分服體氣熱是客熱當自漸加衣物雖似惡加之後必佳忘如常法此方甚

良 千金

又壓丹石發方 天台山潤清 杏仁 一百粒 去皮大 右一味以水二升於鹽中研之絞取汁令盡以白麴二升

用杏仁汁漫作餽餽還以杏仁汁煮務令極熱其病者量性多少噉之令盡訖又取美酒數升煮十餘

沸候熱訖病者量性多少飲之徐令盡蓋覆安卧初覺心悶頃間四體輕虛一服三年不發大效

又療乳石發方 甘草 麻黃 去節各 一兩 右二味切以水三升煮取半升和清酒半升其患者先須火逼

炙熱撒欲汗承熱服令盡蓋衣卧須臾大汗即差 千金

又若因食倉米臭肉動乳方 必須葱豉湯細細服之五六度即差 千金

又食飲損者方 於葱豉湯中加當歸一兩煎之去滓分服即差若未可即服蘆根湯 千金

又若已服安和藥仍不退者此小觸動服葱豉等湯不醒者可服蘆根湯解壓之方 蘆根 地榆 五

加根 兩各一 右三味切以水三升煮取一升服之即解 千金

通按千金
生麥門冬
湯有二
無意有甘
草麻黃一
多甘草入
參所主俱
不同
尚德按千
金生麥門
冬湯有二
其二和通
所說其一
多甘草桂
心人參
尚德按交
千金異作
炙
尚德按根
千金異作
皮

通按千金
其腦氣
不和作
氣所生
腦氣不和

通按此條
有誤字

尚德按半
疑當作半
通按此方
千金量藥
服石散發
麻痘其節
度不同

又若得時氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘧久久不瘳損人性命縱服湯藥必終難差宜作生熟湯浴之方 以大器盛湯若大熱投少冷水即於湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中

出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定久乃出湯以衣被覆蓋睡滿然平復如患太重者不

過三兩度即差千金同
又解一切石發方法倍珍 胡豆并 右一味搗研之以水八合絞取汁飲之即差虛弱人半升中平以意

量之
又大黃丸方 大黃五兩 大麻子五兩 中以手按去皮取仁研如膏 右二味合治令勻以蜜和丸如梧子大

以湯飲下十九至二十九以宣利為度此方甚妙通陽壅秘服之尤良忌如常法
華陀薺芫湯療石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不欲食若服紫石英發毒者亦熱悶惛惛喜臥起止無

氣力或寒皆是腑臟氣不和所生瘡之方尚德按肺臟氣不和所生 薺芫薺芫 甘草各一 藍子各一 茯苓

黃芩兩各二 蔓青子升人參 芍藥兩二 右八味切以水一斗煮蔓青子取八升去滓內餘藥煎取三升

去滓分三服日三若虛弱倍人參若氣上加茯苓薺芫一兩甚良千金量云若虛弱者倍人參或黃

應揚州所得昇故單葱白湯藥瘡沉體中數年或更發宜服之方 葱白切一 右一味以水五升煮取

二升半去滓服盡未定更作服之至二劑即止
又瘡乳石發瘻尚書傳蕭亮常服良驗余因熱重盛切慮不安過於亭虔祐率更吳昇諸議處求解法亦

稱此味奇絕方 甘草兩二 生犀角一兩 姜三兩 右三味切以水四升煮取一升半分服甚效

又方 烏豆升二 右一味以水九升煮取五升去滓以銅鉢重湯煮取一升每服一匙盡即差未定更作

佳

又若盛熱發方 取無灰酒煮三五沸承稍熱服之以布手巾兩箇浸水以搗熱處取差為妙更互用之

通按此方千金要治
難石發動
尚德按一
疑當作二

又療諸乳石發動口乾寒熱似鬼神為病方 麥門冬八分 五加皮 犀角屑 黃芩各四分 姜藶各四分 梔子四分

升麻四分 大黃五分 芍藥四分 大青 甘草三分 苦參六分 右十二味搗篩蜜丸食後以蜜水服十四丸漸加

至二十九日再意加減千金

又療諸石發熱固苦方 豬脂五斤 芒硝五斤 葱白五斤 豉心三斤 右四味以水三升煮葱豉取一升二

合去滓下豬脂芒硝分三服未差再服千金

又療石發熱或充實四體煩滿脈急數大小便赤澀升麻湯方 升麻 黃柏 黃連 甘草各三分 黃芩

芍藥六分 白鴨通五斤 淡竹葉一斤 梔子十四枚 豉升 大黃二兩 右十一味切以水二斗煮竹葉鴨通取一

斗一升去滓澄清取一斗內諸藥煮取四升去滓分三服若上氣者加杏仁五合滿加石膏二兩附金

又常防備熱發法方附金 麥門冬三升 甘草一斤 人參三兩 右三味搗篩蜜和丸如彈丸一日服三

丸甚良附金

又三黃湯折石熱通氣泄腸胃解肌方 大黃三兩 黃芩二兩 梔子七枚 甘草二兩 豉升 麻黃一兩 右六

味切以水九升煮麻黃去上沫下諸藥煎取三升半下大黃三五沸去滓分服得利以差止附金

又方 黃芩二兩 豉五合 葱白五合 梔子七枚 右四味切以水四升煮取一升八合去滓分服三劑差止附金

又療石發身熱如火燒黃芩湯方附金 黃芩三兩 枳實二兩 厚朴炙 桔梗 芍藥各二兩 梔子仁十四枚 甘草

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌如常法附金

又療熱氣結滯經年數數發方 胡荽半斤 五月五日採陰乾如此物可先收貯備之 右一味以水七升煮取一升半去滓分

服未差更作服春夏取葉秋冬取根莖用

又療膈上熱方 柴胡 黃芩 甘草 茯苓 麥門冬去心 枳實炙 生地黄各三兩 竹葉切 右八味切以水一斗煮取三升去滓分服

又方 取河中石不限多少燒令赤投小便一大升候令頓服之良

又方 取寒水石長含以差為度

又方 取黃連水漬服一升最良

又療心下煩熱悶內熱不安冷石湯方 冷石半兩細研以酒尚 右一味以水攪如白飲頓服不差更

作

又去石毒麻黃湯方 麻黃二兩 甘草二兩 芍藥二兩 右三味切以水五升煮取一升去滓分溫再服之

又猪膏湯解大散方 猪膏二兩 之鼓升 右二味以水三升煮鼓取汁一升內猪膏服七合日三服石人

飲食宜清冷不宜熱熱即氣擁痞石唯酒一種須熱也千金

又療乳石發如寒熱狀似瘧方 前胡升 黃芩 甘草炙 生薑 知母各三 牡蠣炙 石膏各二 大棗二升

右八味切以水一斗煮取四升去滓分為四服取差為度此方甚良

又療胸背頭中遊熱補虛方 黃耆 芍藥各三 甘草炙 桂心各一 茯苓 人參 石膏 生乾地黄

生薑 麻黃師法 麥門冬去心 大棗三升 竹葉切一 右十三味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去

滓下諸藥煎取三升去滓分服之一方無茯苓有大黃

又療石發諸藥療不差方 以硝石含之效

又方 若熱盛可向冷地卧腰下以厚物薦之腰以上令薄使受稍似涼即起不得過度

又三黃丸療虛熱氣壅不通方 黃連 黃芩各三 大黃二 右三味搗篩蜜丸以湯飲下十五丸至二

十丸如梧子以利即差

又療精神如失氣攻上骨熱方 柴胡 升麻 黃芩 澤瀉各三 淡竹葉切一 生地黃切二 乾薑 芒

硝各二 右八味切以水八升煮取三升去滓下芒硝分服取利止忌如常法

又療石熱將行體微筋青即此方從叔汾州刺史河東公口受此法余久服石每服此飲頗甚為效方

通按此條疑有誤字

通按冷石未詳

又瘡服諸藥不效者以地蘇又不忌食酒藥酒等方 五加根皮 右一味切以水四

又療諸瘧熱不除。腹滿。小便赤大。便不利。吐逆。氣衝。胸口焦乾。目赤。重熱。三黃湯方。黃連。芒硝。

右五味切以水五升煮取二升半去滓下芒硝分服以利為度甚良妙

又療天行丹石發動上下癰隔不通面痛口苦不能食立效方

唐本注
主癰隔

青木香 紫葛 紫參 玄參

丹參 苦參 人參 石膏 代赭 細辛 桂心 獨活 茯苓 乾薑 齊鹽 吳藍各一 巴豆

右十七味搗篩蜜和丸如梧子有患服三丸強者服五丸餘即量與之以飲下得快利三兩

行即差忘如常法

又療石發內有瘡血胸中痞滿外風濕不醒肌肉拘急方 香豉_十梔子_四 葱白_一 黃芩_二 右四味

切以水七升煮頭五六沸去頭內藥煮取三升分三服之不止更為之千金翼同

又猪肚石起各作攤便宜服升麻湯方升麻大黃黃芩芍藥枳實兩甘草二當歸一

有以寸八寸者則三升分三服服以清酢如蒸加黃芩三兩翼同

未切之木七升煮取三升分服之上

又療服散不得力食不下飲西睡散輒區吐未三黃易方
枝五合 梔子十四 只實八分 甘草炙前用

大黃一芒硝二右藥切以水七升煮取三升分服

又增損竹葉湯散下氣方 黃連 麥門冬去竹葉切 人參略二 枳實 梔子略一 甘草炙 茯苓略二

右八味切以水八升煮取三升分服之差止

又療心忪熱煩悶如火氣上方 石膏兩茯苓 萆薢 黃芩各四兩橘皮 五味子 乾藍 麻黃去節甘

石散熱喉腫口乾方六首

草犀角二兩杏仁二兩梔子三兩右十二味切以水八升煮取三升分服之差止

又療虛勞下焦虛熱骨蒸煩疼肌肉急內痞小便不利大便數而少吸吸口燥少氣折石熱方 大麻仁

五合 豉二兩右二味以水四升合煮取一升五合分三服三劑即止同

又療內熱結不除或再服散或以酒飲冷食淨化猶不解或腹脹頭痛眼睡疼或先有癖實不消或連飲

不食或時作心痛服此湯皆愈方 甘草足黃芩足大黃各二兩右三味切以水五升煮取二升分三服

千金

又散熱白鴨通湯方 白鴨通五升以沸湯二斗半麻黃四兩豉二升石一兩梔子仁二十枚甘草破五兩石膏

三兩

右七味切以鴨通汁煮取六升去滓內豉煎三沸一每服五合若覺冷小便利闊其開若熱猶

盛小便赤促服之不限五合宜小小勞漸漸進食不可令食少但勿頓多耳同

千金

又下氣除熱前胡湯方 前胡足黃芩足甘草足茯苓各二兩梔子仁足枳實足大黃各一兩杏仁六十枚生

薑

斗煮取三升半分三服之

又療服升麻湯內解外不解者宜此麻黃湯方 麻黃去節升麻各二兩大黃黃芩石膏碎各三兩甘草足一梔

子仁各三兩

右七味切以水九升煮取三升分服之差止

又療腹中無妨直患虛汗方 澤瀉足知母足石膏碎各二兩當歸足甘草足人參足桂心足黃芩足茯苓足

麥門冬

右十一味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去滓下諸藥煮取四升分服

差忌

石發熱喉腫口乾方六首

通按肺母火也更詳

論曰五臟之尊心離為王而肺最居其上也肺為華蓋覆其四臟合天之德通達風氣而肺母火也性憤

尚德按頭
疑當作肺

受溫而惡寒心火更炎上蒸其肺肺金被火傷則葉萎倚著於肝肺發痒即嗽或因石增熱心肝虛弱不能傳陽至下焦遂被正陽俱躋變成嗽矣或為發背或作癰頭也夫言惡寒則何以知也肺主皮毛皮毛遇寒即慄而栗起其肺嗽亦姜倚著肝而成病亦由木能扣金與鳴也凡如此先食養肺抑心肺虛熱和其腎即愈矣

療石發熱衝頭面兼口乾嗽方

生麥門冬去心 姜桂

石膏

碎各三兩

生地黃汁

七合

葱白

一握

乾葛

四兩

欬心

三合

右七味切以水七升煮取三升分三服忌如常法

尚德按食
疑當作肺

又療熱嗽方 取生敗漬汁溫之纔免令食服訖即卧勿令入腰中故也以意消息之

又天門冬煎主宅肺氣去風熱明目止嗽喘粗血腥乳石發冷而補之方

通按天冬性冷而能補病虛熱者宜服

天門冬

汁升生地黄汁升生薑汁升杏仁五合去皮

白蜜八合

牛酥五合

欬冬花

升麻

百部根

紫苑

麻黃

去半

去半下天門冬等汁次第下之鍊成煎取一匙含咽之日三五度取差忌如常法

甘草二兩

右十二味切以水八升煮麻黃去沫下諸藥煎取二升去滓澄濾銅器中微火煎

又療上氣肺熱呼吸喘涕唾方

麥門冬十升

杏仁三十枚

去

貝母

生薑切

石膏碎

黃芩五

甘草炙

五味子

白朮切

淡竹葉切

白蜜匙

右十一味切以水四升煮取一升二合去滓內蜜分服若

須利入芒硝

又療肺脹氣急呼吸喘喘眠卧不得極重惡氣即絕紫苑湯方

紫苑六分

甘草炙

茯苓切

梔子切

檳榔碎

葶

薤子三分

右五味切以水六升煮取二升去滓分再服

又宜服九主上氣呼吸不得卧卧即氣絕方

葶藶子

葶藶

熱

馬兜鈴

紫苑

人參

杏仁炙

火皂莢去皮

白前

甘草炙

漢防已炙

右十味搗篩蜜和丸如梧子大服十九至二十九增減量

之

石發兼虛熱痰喘乾嘔方五首

論曰凡人有五臟合則脾胃為水穀之府且國府足穀則足食足兵也人胃足食則榮衛不厥若人能食則能悅也陰陽和平有何患乎若服食之人皆增於熱失時不食則胃口乾焦胃口乾焦則土不足或因飲酒水而食少變為痰結酒水流下迎令上昇下焦無陽即陽虛也中腑無穀上焦漸炎致陽嘔噦經曰陽數即嘔吐又曰嘔噦發下焦之間此之義也可以破痰結通水穀填胃腑則無咎也夫通填之義不可虛其虛實其實岐伯曰瀉虛補實神去其室他臟皆倣此

療因飢空腹飲酒飲水食少痰結心頭乾嘔方 枳實兩三 梔子仁兩一 香豉升半 大黃三兩 右四味切以水六升煮取二升分再服忌如常法

又療結熱澀心下腫胸中痞塞嘔逆不止雁肪湯方 雁肪具 甘草炙 當歸 桂心 芍藥 人參 石膏碎各 桃仁三十枚 太東二升 大黃兩二 右十味切以水一斗二升煮雁肪取汁一斗者諸藥取五升

去滓分服無雁肪以雁肉無雁以鴨代之雞亦得 又療嘔不止不下食方 雞白經 橘皮兩一 豉升半 麥門冬去心 粟米合 右五味切以水三升煮取一升去

滓細細服之差止 又療熱發胸中痰醋乾嘔煩熱方 半夏洗 白薇 乾薑各一兩 甘草炙半兩 右四味切以苦酒五升煮取

三升分服夫苦酒能令石朽爛故用之 又療數振動煩悶嘔逆人參湯方 人參 甘草炙 栝婁 麥門冬去心 黃芩 蘆根各一兩 右六味

切以水四升煮取二升分四服差止 石發吐血衄血方七首

論曰五臟所藏心藏血也血之傷盛則心脫力制固無守自然流溢為陽氣傷故也或有衄血者加以肺風熱之謂也若益之於服石則客熱復盛榮衛增勞旋周無度則投虛而出出而多則傷榮氣色奪而黃久不瘳則氣藏藏陽損九竅破汚血留好血調經絡平腑臟則愈也

療石發熱盛吐血方 生地黃五兩 小薊根切 黃芩二兩 梔子仁三 右五味切以水五升煮取

二升分溫服之

又衄血方 生地黃汁 小薊汁 右二味隨多少以點鼻中兼服之良

又療心腑中熱其鼻中衄血不止方 胡粉無 光墨末 金下墨末 乾薑 髮灰 伏龍肝分等 右六種

但得一物以兩著子許以竹筒吹令入兩鼻孔中即止

又方 橘皮 蒼耳莖葉 翹逆莖葉 生地黃 雞蘇苗 右五種但得一味搗絞汁服五六合即止

如未定即更服之

又療頭痛壯熱并衄血心上硬遍身疼痛四肢煩悶兩膊舉不得方 小薊四兩 青竹茹 生麥門冬碎 去

雞蘇各三兩 生薑切 二生地黃汁斤半 右六味切以水九升煮取三升去滓分服之以止為度忌如常法

又療卒吐血一二升口鼻俱出至一二斗者方 生地黃汁 小薊汁 生麥門冬汁 伏龍肝匙 右地

黃等三味汁相和每服五合著伏龍肝末一匙許和攪服之以止為度忌如常法

又療心悶吐血方 生麥門冬八分 生地黃四分 甘草分 薺萇 乾薑各六分 茅根十分 香豉五合 以

右七味切以水五升煮取二升去滓分服之忌如常法

石發熱煩及渴方一十六首

論曰凡人陽處其表陰處其裏則非純陰在其下復非純陽在其上皆須陰陽通平陰陽通平則五氣不
乏五氣不乏則人無病只如服石之人多為陰虛而服攝之過溫則經脈湊溢或遭陽時亦發其證也正
陽本自浮昇石力更藏陽氣客主兩陽併蒸肺肝故患渴也或臟實腑虛而生發背亦渴不獨兩陽為禍
也且肺是庚辛庚辛畏火即告其子其子腎腎為壬癸錐子投而性惡寒陽雖得水暫寒而水潛流於下
客水正水足為滂沱渴乃未除更增腎冷凡遇此候皆先泄溝瀆致陰氣於腎微理其石氣孰不痊乎
療解散失度飲食冷熱不消虛脹吐清水而渴悶欲死方 人參 栝婁 枳實炙 甘草炙 白朮各一大

升壹室必要卷三十八

石發熱煩及渴方一十六首

棗二十枚

右六味切以水六升煮取二升半分溫二服差止

又療發癰虛熱大渴方

生地黃八兩

竹葉切三升

小麥二升

黃耆

黃芩

通草

前胡各三兩

桔槩兩

芍藥兩

升麻

甘草炙

大黃別知母

茯苓各二兩

人參

當歸各一兩

右十六味切以水二斗煮竹葉小麥取

一斗去滓內餘藥煮取四升去滓分服之小便利除通草大熱者去人參當歸忌如常法

又療客虛熱衝上焦胸中口乾燥頭面熱赤并渴方

生葛汁

生地黃

生麥門冬

汁白蜜

升各一

棗膏

合生薑汁合二

右六味和煎之內蜜候如稀餚食後漸漸含之其功甚妙

又療消渴止小便方

黃連已斷

麥門冬各二兩

生地黃

羊乳

桔槩汁

右五味搗上二味

為末以汁相和藥末聚手一時丸如梧子食後以飲服二十九忌如常法

又療熱渴竹葉湯方

淡竹葉切五升

茯苓

石膏碎各三兩

小麥升三

桔槩兩

右五味切以水二斗煮竹葉取

八升下諸藥煮取四升去滓分服忌如常法

又療發癰盛患渴口乾排膿止渴方

黃耆

梔子仁

桔槩

生乾地黃

升麻

麥門冬各二兩

芍藥各二兩

又方黃芩半兩

右八味切以水一斗煮取三升服之差止忌如常法

又療消渴方

取螺升

右一味以一石江水浸養之傾澄取汁飲之經日放却更取新者漬之進前服

又方竹根濃煮汁飲之

又方煮青梁米汁飲之

又方搗冬瓜汁飲之

又方冬麻子仁

右一味搗以水煮三四沸飲之

又方以水浸雞子取清生服甚良

又方黃柏升

右一味切以水一斗煮汁飲之

又方桃仁五升去

研白米升

右二味以水一斛煮取三升渴即飲之良

又方 石膏碎枳實炙茯苓各三兩 右三味切以水九升煮取四升分服之

又方 茯苓半斤澤瀉四兩白朮乾薑桂心各三兩小麥三升甘草二兩 右七味切以水一斗煮小麥取八

升入藥煎取五升分服之

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

論曰五行五臟皆互相生肝雖處中而為臟首位在甲乙懷養懷仁故應春而王也為心之母餘臟循而次生焉心為王主身神殺而無纖不察四臟為四鄙四鄙有憂王必懷憂四臟和平則王有悅悅則榮衛不錯憂則經絡患生心不受邪所病者為憂無能致也肺為風腑施於太穹為呼吸之門氣息之道也諸臟紊亂氣息皆形誰能出不由戶耳若熱風感心憂即頭痛若過憂即心煩熱感必寒寒感必熱倚伏之道足可明焉皆緣風狂邪熱之謂也但平風熱抑狂邪榮衛自然通泰也

療熱如火燒頭痛心煩悶乍寒乍熱胸中熱嘔逆方 升麻 前胡 甘草炙黃連各二兩黃芩 生地黃

各三枳實炙梔子仁 枳實各一兩五合 右十味切以水八升煮取三升分服忌如常法

又療食訖心煩悶眩心下胸中不安方 茵陳四兩大黃二兩梔子仁二十枚 右三味切以水五升煮取二升

分服取差

又療頭疼欲裂方 取當歸二兩清酒一升煮取六合飲至再服

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

論曰夫人痒者為虛痛者為實在表為虛在裏為實心肺虛熱衝胸口乾乾久乃成瘡生膿則痒矣自然虛極非是實也藏者藏也為不能含藏陽氣使陽氣妄出發則日虛若獨肝家有風即木氣搏心故痛亦非真心痛若真心痛只得半日而死為心不受邪故也

療乳石熱發頭痛心痛胸脇脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣氣上欲絕久虛者方

前胡 芍藥 黃芩 大黃 甘草炙大棗二十枚 右六味切以水八升煮取三升分服若堅實加

尚德按藥
疑當作真
若
苦疑當作
尚德按藥
疑當作腸

兩及身上心痛方二十四首

茯苓二兩若胸滿塞加知實一兩炙若吐逆加乾薑二兩若口燥加麥門冬二兩增減以意量之忌如

常法

又療食失度口中發瘡漱之湯方 黃芩^{三兩}升麻 甘草^{二兩}石膏^{碎五兩} 右四味切以水五升煮取三

升去滓冷含漱口吐却日十數過差止

又療口瘡方 子柏^{四兩}龍膽^{三兩}黃連^{二兩}升麻^{一兩} 右四味切以水四升煮取二升別取子柏冷水浸投湯

中令相得絞取汁稍稍含之取差忌如常法

又若熱發腹內胸悉有瘡方 升麻^{二兩}烏梅^{十枚}黃芩 黃連 桔萸 甘草^{炙一兩} 右六味切以水五升

煮取半去滓含之咽亦不妨

又療體赤熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食方 黃芩^{三兩}梔子仁^{二枚}香豉^{升二}大黃^{二兩} 右四味切

以水四升煮取一升半去滓分服

又塗飛雪湯方 麻黃^{四兩}石膏^{碎二兩}黃芩^{三兩}芒硝^{四兩} 右四味切以水八升煮取四升去滓內生雞子

白二枚及芒硝攪令勻以拭瘡上取瘡差即止

又療熱不散體生細瘡并熱不止方 黃連 芒硝^{略五} 右二味切以水六升煮取三升去滓內硝以

拭瘡上取差為限

又療紫石發動惡寒壯熱口舌乾焦方 烏豆^{二兩} 右一味以水四升煮令稀調得所如錫去豆下蜜二

合更一兩沸以匙抄細細含之如腹中鳴轉欲利即停得利即差忌熱食陳臭物^{千金翼治發背癰疽}

又療石氣發熱身體微腫面生瘡方 升麻 萎蕤^{各六兩}黃芩 紫雪^{各八分}甘草^炙犀角^{各四} 梔子^{十四枚}

右七味切以水五升煮取二升內雪分服之以飛雪湯塗之即差^{千金翼同}

又療體卒熱生瘡麥門冬湯方 麥門冬^{五兩}豉^{升二}桂心 人參^{各二兩}甘草^{炙三兩}蔥白^{一斤} 右六味切以

水一斗煮取三升去滓分服之忌如常法

尚德按實
擬當作裏

尚德按實
不用蜜

通按飛雪
湯塗千金
翼作用寒
水石冷水
研濃汁塗

勿令乾
兩德板裏
用炭水石
別為一方

又療表裏俱熱身生瘡或發癰癤大小便不利方

芒硝馬成

黃芩

知母

甘草各二兩 梔子仁七枚

大黃兩

右六味切以水五升煮取二升下芒硝分服忌如常法

又療兩耳生瘡熱痒內亦熱兼頭痛方

麥門冬法知母

澤瀉

甘草

各二兩 梗米五升 竹葉切 小麥升

右七味切以水一斗半煮竹葉小麥取九升去之內諸藥煮取四升去滓分服日三夜一忌如常法

又療生瘡熱氣奔胸方

豉升 葱白切

梔子仁略

右三味以水二升煮取九合去滓分服之忌如常

法

又療石熱發煩熱滿脹及體生瘡兼氣力弱方

黃芩

芒硝

麥門冬

各二兩 大黃

梔子十枚

甘草一

右六味切以水六升煮取二升分再服之

石發腹脹居滿兼心痛諸形證方七首

論曰服石之人發狀非一或發於外陽則頭角皮膚作病癰腫頭痛是也或發於內陰則反冷臟虛口瘡吐血是也凡氣內溫五臟外榮經絡石性清淨不喜煩穢目所覩鼻所聞皆欲馨香不願鬱腐因成種種之病也或食陳臭生酸之物助於胃腑胃腑不受推諸臟諸臟不受即肝膈痞滿或為臃脹而堅積便發心痛亦非心自然而痛為機械觸神氣也覺此候者可速滌腸胃無令留壅不然即成痰癖其心轉痛豈能不勉哉

新即瘡寒過度成痰癖水氣心痛百節俱腫者大黃丸方

大黃

葶藶子

豉

各一兩 杏仁去皮 巴豆各三

十顆去

右五味大黃搗篩末四味別搗如膏入少蜜和更搗一千杵以飲下一丸如麻子稍強至二

丸三九以意量之忌如常法

又療赤石脂發心痛飲熱酒不暍方

葱白

豉

右二味

以水六升煮取二升半分服之良

又療大熱心腹滿脹方

石膏

黃芩

麻黃

芍藥

大青

續斷

右六味切以水八升

煮取四升去滓分服之

外臺祕要

卷三十八

石鍾發目赤方一十一首

七

又療心腹痛不解若通身顫寒者當衛不通人參湯方

麻黃去節三兩

人參

枳實炙

黃芩

甘草炙茯苓

各一兩右六味切以水五升煮二升分服之

又療散發心腹痛脹兼冷熱相搏甘草湯方

甘草炙

枳實炙

白朮

梔子

各二兩

桔梗三兩

右五味切以

水六升煮取二升分再服之忌如常法

又療腹脹頭痛眼疼先有癰實不消或飲酒下食內熱或時時心急痛方

甘草炙

黃芩

大黃

別浸

門冬去心芒硝各二兩梔子三十枚

右六味切以水七升煮取三升分服忌如常法

又療石發動上氣熱實不除心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胸口乾燥目赤痛方

大黃別浸

黃芩

三兩

黃連 甘草炙芒硝 麥門冬去心

右六味切以水五升煮取二升入大黃更煎三五沸去滓分

再服之

石鍾發目赤方一十一首

論曰凡人五臟盡有風而發有高下動有深淺則腎風發脚氣肝風目淚而暗肺風鼻鼽嚏而嗽脾風肉緩而重心風恍惚而忘若加於熱亦隨臟觀候即肝風骨滿而怒喜靜加之熱即目漠漠而暗若石氣兼之則赤而益痛或生努肉及腫而爛速可隨輕重瀉之不然喪明矣經曰肝王則目赤若兼石則冬慎勿食熱熱既不散遂成伏氣遇春必發預宜法防之即非石藥之過豈不惜哉黃帝曰形受味精氣皆為飲食寒溫呼吸之召也諸臟候此

療眼久赤痛方

乾桑

相接長一尺切

黃連

相接長一尺

右二味以水一升煎三合綿裹夜臥點眼皆中以差為度

忌如常法

又瀉肝湯不服石人亦主之方

大黃

黃連

石膏

二兩

甘草炙

黃芩

細辛

生薑

半夏

先各一兩

梔子

各三枚

右九味切以水八升煮取三升分溫服忌如常法

人參眼赤閉目不開煩悶熱胸中痞瀉瀉肝湯方

前胡

大青

秦皮

乾薑

子芩

細辛

各三枚

右九味切以水八升煮取三升分溫服忌如常法

大黃

黃芩

細辛

各三枚

生薑

半夏

梔子

先各一兩

右九味切以水八升煮取三升分溫服忌如常法

大黃

尚德按內
疑當作肉

明子^三掩子仁^二石膏^兩八流竹葉 車前葉^{一升} 右十一味切以水一斗煮取三升去滓分服或加朴硝三兩得利即差忌如常法

又療眼腫痛不開方 精猪肉薄切以貼眼上熱即易之一方用子肝又以井花水浸更再用之取差又療久風目赤兼胎赤方 光明鹽^分杏仁油^{五合}又云 右二味以淨銅鑊一尺面者一枚內鹽油即

取青柳枝如筋大者一握急速截令頭齊用研之三日候如稠墨即先剉地作一小坑置瓦于底又取熱艾一鵝子許於瓦上燒火即安前藥鑊覆坑上令烟薰之勿令火滅候火盡可收置於銅合子或埴

合子中每夜用點眼皆間便臥頻點之取差^{通按前目病胎赤用此方}又主眼生赤脈息內疼痛不開者方 大棗^{七枚}黃連^{二兩}碎 淡竹葉^{切五合} 右三味以水二升煮竹葉

取一升澄清取八合內棗肉黃連煎取三合去滓以點眼皆中差止又療眼痒赤方 黃連^兩碎 丁香^{七枚}黃柏皮^兩切 青錢^{七文}麝仁^{三枚} 右五味以水二升煮取一升去

滓以綿纏杖子頭點之妙又療發熱心腹脹滿小便赤大便難逆衝胸中目燥目赤痛方 黃芩 大黃^兩二 梔子^兩三 右四

服至二枚十日十枚還從一起甚驗又療發熱心腹脹滿小便赤大便難逆衝胸中目燥目赤痛方 黃芩 大黃^兩二 梔子^兩三 右四

味切以水三升煮取一升二合去滓分服又療目瞽方 乾藍 雄黃^{二分} 右二味相和以少許點上三五度即便差

石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首論曰夫老小疴羸為和氣不足寒氣獨積於地炎氣獨散於天天地不交故體成否體成否則肌肉不潤

曉理不通胸膈氣急肚胃招滿為陰氣衝陽陽不接也或膀胱堅積支足沉痾為陽氣不能下營陰氣獨盛也致大腸留擁湯藥不下或水穀不消更加短氣若不利關格實不得其死也

瘵羸方老弱體性少熱因服石散而寒氣盛藥伏胸膈冷熱不調煩悶短氣欲死者藥既不行又不能大便作害於人急宜吐之方 甘草生用 右一味切以水五升煮取折半去滓令頓服之當大吐藥亦與

病俱去便愈矣夫散家患心腹痛服諸藥不差者服此甘草湯諸膈即通大便亦利甚驗

又瘵其虛弱去熱益氣力方 竹葉切 一大棗二升 黃耆四兩 芍藥三兩 甘草炙 人參 乾地黄 升麻 生

薑兩各二 桂心 黃芩 茯苓兩各一 右十二味切以水一斗五升煮竹葉取一斗去竹葉入諸藥煎取

三升分溫服之忌如常法

又瘵散發後虛熱羸乏或脚疼腰痛本是虛勞人并挾風宜腎泥湯方 羊腎脂膜切 五味子三當歸

甘草炙 芎藭 遠志法 芍藥 麥門冬法 茯苓兩各一 乾地黄 生薑四兩 黃芩 桂心兩各一 大棗二十

右十四味切以水一斗煮腎取八升內諸藥煎取三升半去滓分服忌如常法

又瘵性熱虛羸補益方 生地黃二石細切 右一味以好酒一升灑之暴乾擣碎併手丸之每食前含

一丸如胡桃大咽令盡日三五度甚妙

又瘵人身體黃瘦不能食及服藥腰背拘急痛眠臥床沉重不能起行宜秋夏中服之方 半夏洗 茵

陳兩各四 生薑 茯苓各三 黃芩 土灰根 梔子兩各二 大黃別浸 右八味切以水八升煮取三升

去滓分溫服

耆婆湯瘵人風勞虛損補髓令人健方 麻油和牛酥 酥斤各一 胡麻仁研一 歧二升以水二升 蜜升上

酒仁 右七味先於鍋中入油煎令沸者色白 色黃下酥蜜歧汁麻仁沸下酒成煎收不津器中盛

之日服一匙兩匙或和酒服亦妙冷即加生薑一片取汁乾薑末亦可用之

石發大小便不通兼小便淋方一十六首

論曰夫言大小便澀者皆錄大腸虛受邪氣所致也且腑有高下而肺腑係在天上中接土腑名之大腸

為傳導之腑也有風氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾燥或腎腑有虛則心肺俱熱使小

便赤而澀也或腎氣虛熱膀胱不足加之渴飲即小便淋澀皆歸臟虛不能主其納也且形能受味氣能致精氣散則精虛味益則體實體實之人筋骨有餘因勞精氣精氣既衰則其納穀石氣流入膀胱作其淋疾則非正石氣而行其神遺熱盛傳之於腎腎為精竭純陰自孤石氣懼陰不入便投其膀胱膀胱受邪遂成淋也淋狀合遺熱而痛何以知之澀至故知肺傳於子也數至為子後母通火急奔下也熱赤至為一與石氣相傳也痛至為本臟白虛客氣傳也所以服石藥者精其少滋味而助精氣即神門之固病邪不能入也何以知因石虛竭虛竭之人其陰外怒而交接雖畢其病名強中或不交接其精自流也或為自利為作清濁皆由少服諸石用之傷勞也夫過茲候等可救其病失時不療使至天枉不可全服補虛之藥惡變諸疾常以不虛不實於大腸不寒不燥於膀胱理能調神氣有何患乎療小使淋澀少腹痛方 大黃 芍藥 茯苓 麻仁 右四味切以水五升煮取二升去滓分服之良

又方 桑螵蛸^{二十枚} 黃芩^{四兩} 右二味切以水一升煮取四合頓服之

又療熱淋澀痛方 車前草^{切各一升} 葵根^{切各一升} 通草^{三兩} 芒硝^{八分} 右四味切以水五升煮取二升去滓入芒硝分服之

又療血淋不絕方 雞蘇^{竹葉} 葵子^未 石膏^{八分} 蜀椒^{末四} 右五味切以水二升煮取九合後下葵末服之

又療初患淋方 滑石^{二兩} 通草^{二兩} 石葦^{去毛} 瞿麥^{各三兩} 芒硝^{二兩} 冬葵子^{二兩} 右六味切以水九升煮取三升分服之忌諸熱物

又療淋積年醫不能愈或十日五日一度發即可時或頻發不定方 冬葵子 滑石^{各八兩} 茯苓 芍藥

子苓 蒲黃 芒硝^{各六兩} 石葦^{去毛} 瞿麥^{各五兩} 陳橘皮^{四兩} 右十味搗散空腹煮後飲子和服一方寸七

加至二匕以小便通利為度忌如常法

外臺必用

石葦去毛

石葦去毛

下散飲十方 桑白皮分六 白茅根分六 通草分八 甘草分十 石五味搗散煎湯服前散

又卒患淋方 取缸底青苔如雞子大以水一升煮服之

又主熱淋方 白茅根斤切四 右一味以水一斗半煮取五升適寒溫飲之差止

又石淋狀如碎沙石下者方 車前子二斤以 右一味以水八升煮取三升經宿空腹服之即石下

又療煩熱身體微腫不能食飲小便不利方 茯苓兩三 甘草兩三 桔梗根 人參 黃芩 桂心 白朮各

兩枳實兩二 右八味切以水六升煮取三升去滓每服三合盡即差甚沙

又療氣上不得食嘔逆大小便澀氣滿煩悶折熱下氣方 前胡 黃芩兩各三 梔子 大黃兩各一 甘草兩各

茯苓 生薑兩各二 杏仁四升去 右八味切以水八升煮取三升分服之忌如常法

又療熱小便數少如淋葵子湯方 冬葵子斤 右一味以水三升煮取一升分服之忌如常法

又若大小便塞不通或淋瀝尿血陰中疼痛此是熱氣所致先以冷物熨之小腹又以熱物熨更互冷熱

若小便數亦是取冷所致即暖將息也

療發熱體氣昏不痛不痒小便赤澀方 生茅根五斗淨洗擇搗絞取汁服之

又若發熱口乾小便澀方 取甘蔗去皮盡足喫之咽汁若口痛搗取汁服之

又方 取薤蕪五兩煮汁飲之差

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

論曰服石之人體常多熱熱即引飲飢復加食水穀既傷胃府失度土既衰損木必來乘故曰肝入胃即

泄或單下而不吐是肝乘之盛也木既剋土壯過必宣二氣俱虛而肝必怒陽氣既之則發轉筋變吐加

肝肝之病也宜速止之仍溫足而靜復調以五味其病必痊矣

療石發霍亂絞痛不可忍方 薤蕪斤 右一味以酒三升煮取一升強服之得下差

又療霍亂吐多者必轉筋不渴即斷上藥者腎氣虛先療其藥理中湯方 人參 桂心 甘草各兩各

通按腎氣虛仲景謂

通按一跌
 約上當是
 量一跌之
 長約於臍
 下也然脚
 長一尺二
 寸跌居其
 大半而天
 經至橫骨
 徑長六寸
 何穴不識
 通按美矣
 當是美矣

薑^二 右四味切以水八升煮取三升分服又加白朮三兩

又療霍亂轉筋入腹方 取雞屎白乾者一方寸以水和頓服之

又療轉筋入腹痛方 灸脚心下當拇指上七壯

又方 灸足大拇指下約中一壯

又乾嘔方 灸手腕後中指兩筋間左右各灸七壯名間使

又若吐止而下痢不止方 灸臍下一跌約上二七壯尚按跌與當作夫千金云覆手并舒四指對度四指上中節上橫過為一夫

又嘔不息者方 薤白^根 右一味切以水一升煮取六合頓服之

又吐痢不止轉筋入腹欲死方 生薑^{切三} 右一味以酒一升半煮三沸頓服之良

又方 霍香^把 右一味以水四升煮取一升服之差文亦佳

又療轉筋不吐不下氣息急方 木瓜^枚 右一味切以水二升煮取一升服之差

又方 高良薑^{五兩} 右一味以酒二升煮取一升服亦主腹痛

又方 桑葉^{切二} 右一味以水三升煮取一升三合去滓服之

又療腹滿痛不可忍方 取鹽一合熬以水二升煮取一升頓服即得吐止若吐痢止心中煩悶及渴不

止取竹瀝一升分服即止不止心中復似冷取茱萸一兩於鑊中炒棗末以水二升煮取一升著少鹽

澄清服之取差

又療霍亂吐痢不止方 粟米^{少研} 右一味以水攪如乳服之即差

又療脚轉筋方 灸兩大拇指爪甲後連肉處當中夾三壯

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

論曰凡石性剛烈氣多炎上理之傷溫即火轉為熾內煎脾肺脾肺若執遂成其渴飲水過量即渡腸胃
 胃得水則吐腸得水則金寒藏熱寒火炎不滅水漸流下而為行澀遂變癰腸胃虛冷水穀不消在陽益

氣不食在陰腸鳴而泄久將不差有成痢者經言嘔噦發下焦之開其斯之謂歟療下痢乾嘔服香豉多服之佳如不損更發宜服此方 香豉^{半斤} 乾薑^{兩三} 甘草^{兩二} 葱白^{切一升} 右四味切以水五升煮取二升

去滓溫分服之甚良

又方 乾薑^{兩五} 右一味切以水二升煮取一升去滓頓服之

又療白赤痢兼熱悶方 梔子仁^{十四枚} 薤白^{切一} 右二味以水三升煮取一升二合去滓分服之良

又療白痢方 黃連^{一兩碎} 白蜜^合 右二味以童子小便二升漬一宿煮取一升去滓入蜜分服之

又方 黃連^{兩碎} 薤白^{切一升} 烏梅^桴 右三味以水二升煮取一升分溫服之

又療解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連湯方 黃連^{兩碎} 白梁米^合 右二味以水五升煮取二

升分服之

又療癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食元出方 甘草^炙 乾薑 附子^{炮各六兩} 蜀椒^{二百三十枚汗} 右四味切以

水六升煮取三升分服之忌如常法

又療天行藥有客熱下血痢止血破宿起死黃連湯方 黃連^{兩四} 黃柏^{兩三} 梔子仁^{十五枚} 阿膠^{兩一乾薑}

枳實^{多芍藥} 右七味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又療解散除熱止痢黃連湯方 甘草^炙 升麻^{兩各一} 黃連^{兩三} 豉^{合五} 梔子仁^{十四枚} 右五味切以水三升煮

取一升分溫服之

又解散因痢宜服甘草湯方 甘草^炙 人參 黃連^{兩各一} 梔子仁^{二枚} 右四味切以水五升煮取二升

分服之

又療熱毒赤白痢方 羊肝^{去膜切以水洗二十通血} 右一味以水煮熟漉著漿水中淘之乾漉以美

蒜齏候極飢食之不過三兩頓即差

又療水穀痢方 取鯽魚無問多少治如食法以新布乾拭斷血脈切作鱗以蒜齏食之取足候至夜要

以白粥量事喫之即得差忌如常法

石發兩脚卒冷兩臂厥卒熱并口噤方三首

論曰經言脈有陰踠陽踠有陰搏陽搏此在三陰位也脈足太陰脾脈也脾為中州含藏陽氣壓本脈者矣若人之和平則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛不能含藏則地氣漸泄陽上騰則三陰堅寒足便冷也或有踠緩急不仁者則加之以腎肝之氣不足使少陰厥陰之闕也所以足無載運之功而不能踠提其力是陰搏其陽此由臟虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理有因發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷感之所致也况服石增熱食餌失度在陰為瘵可外溫其足內置陽氣於三陰則愈也在陽為瘵可微冷於外又以寒藥散其內熱其瘵豈能逃乎

瘵兩脚卒冷方 以醋漿溫置盆中以浸脚即差

又瘵口噤氣上欲絕方 蔓菁子仁茯苓三麥藍子 人參 薺芎 甘草炙 黃芩 白朮略一 右八

味切以水二斗煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煮分服若口噤以物嚥之即差

又瘵兩腋熱不得相近方 滑石斤寒水石斤芒硝斤 石三味搗散取絹一尺分作袋盛散藥結口更

互於腋下夾之勿住取涼冷止

石發若熱解折下石方四首

論曰五形之人其性各別則土形之人骨聳氣清水利形之人體薄氣長木形之人筋骨靈聲圓而長火形之人性急氣炎而散其有固疾者則先服草藥病愈後始服石必速應也凡土火二形人性躁氣高而肥盛多火氣若更服石益之於炎物盛必哀自焚之名也若覺禍發速宜下之只如固疾之人服石者病氣久強石熱尚薄不能破其病但增其熱亦能損人若熱不濟者亦可速下自餘形人服之者如有發動但以石投之自然而差不可見小熱即求大冷為山九仞終虧一簣譬

尚德按若
疑當作苦

尚德按
疑當作霍

蜂房飲解石餘方 露蜂房三 右一味以水三升煮取一升去滓頓服不定三五日更服如熱悶服後

方千金翼 石發熱困苦宜下石方露蜂房一升切以水三升煮

又下石方 葛根 紫草各八 犀牛角兩 露蜂房兩 芒硝 大黃各二 齊尼 人參各七 玄參 甘

草炙銀屑四兩 猪脂二兩 右十二味以無灰酒漬經十日其猪脂用酒一升煎取脂三兩取銀屑

和研內藥中每日空腹服之題前合藥未得本法元本如此可求別定本細而勘之 有升麻各

又療散發不可堪忍欲下之方 肥猪肉斤五 葱白 薤白各半 右三味並搗研合器中蒸之令熟早朝

噉之盡為度

久療雖服乳石等而常患冷此由不先服瀉湯而服石等以其病藥各在一處丹石不行則病所以依舊

患冷宜依此法瀉之冷自差石勢行方 人參 茯苓 乾地黄 當歸 桔梗 甘草各二

黃兩 右八味切以水三升煮取一升二合去滓分服之

服石後將息飲食所宜法二首

論曰服石所宜飲食時宜以自調護隨所取適若一一依方慎之則動成滯礙能依此法庶得通濟方

取少脂猪肉一月二服百沸饔飩任性無妨新飲白酒少飲亦好及白羊頭蹄並猪肉作羹鼓任作食

之壓石肥肉梨柿等甚佳

凡欲喫熟羊肉饔飩宜先食三五匙冷飯後喫之即不畏熱喫訖乃速以飯壓之行步適散乃可不慮致

損生菜亦然云苔胡荽等亦不宜多食服石人有性好啗醋不能禁慎者宜食淡燥醋百沸紫饔飩及

水菓餅即不慮熱冷韭薤亦大補時時宜食之諸飲食品類既多不可一一但言不得服所不宜者服石

人亦不宜多飲酒飲酒多則失食味失食味則不多食不多食則令人虛熱虛熱則令石數發惡寒寡沉

又損石力為酒能壓石故也多飲則損石勢亦令人風虛脚弱此錄飲酒致之耳若能飲食者大佳甚妙

尚德按衛
與當作衛

其方藥如右服石特忌熱麵陳臭臭哭泣憂患大醋生薑薑芥醬雞犬肉鮑魚肉鮓衡熟老牛肉忌飢冷酒有反酒蕎麥小豆胡麻餅餠枸杞羹倉米羹魚脯勿承飢虛熱沐浴夏月不宜喫猪肉冷水恐致滑痢不止傷冷飲食不消或成霍亂特宜消息慎之

紫餅餠并食飲將慎法三首

千金紫餅餠方

烏豆性多少煮

右一味以和麴稍鹽和之依常法作餅餠以此豆汁中熟煮可三二

十沸溢添冷烏頭汁以猪羊肉為臠亦精好或以山芋粉尤妙

又宜食麴餅方 取麴漫如家常作餅法細切如小豆許以麴於簾箕中拌令圖煮之令極熟承熟任以諸肉作臠食之大涼補腰脚又夏月冒熱遠行早食晚失飢石氣發動作大麥餅將行在路食之亦壓得石氣

凡患瘡腫無問大小或如黍米即須加意專精療之或以冷水淋或鹽湯洗以指搥破即以指甲細細搗傍邊亦以藥塗之或以倉耳湯浸洗之或以冷石熨之即差夫服石將慎至難若不能將息特宜勿服非但服之若瘦熱更增他疾性行躁暴唯多忽恚飲食日減形體日消妻子不能供承卑下何其能濟此皆由將慎失度致使然也人之無檢慎勿輕服至於背坏腦裂藥物無及也婦人則發乳體腫帷簿不脩特宜審慎自量其力將息尤佳

服石後防慎則備雜藥等一首

凡服石人當宜收貯藥等

人參 朴硝 苦竹瀝 大黃 梔子 大麥麴 好豉 薺芎 黃連

升麻 石膏 荆瀝 葛根并粉 猪骨 酥蜜 紫蘇子 白鴨屎 粳米 前胡 冬葵子

生薑 冬瓜 大豆 車前 地榆 五加皮 大小麥奴 天門冬 葱白 萎蕤 麥門冬 生

地黃 蘆根 紅雪 紫雪 黃芩 露蜂房

新書通記 卷之四 雜書

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之


新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之

新書通記 卷之四 雜書 天國今之盛俗 委諸天下 今之



W2467 W

1915

V. 36-38